




Affektive Störungen

Cassano GB et al.: The role of psychomotor activation in discriminating unipolar from bipolar disorders: a classification-tree analysis. *J Clin Psychiatry* 73 (2012) 22-28


14



Schlaf

Parthasarathy S et al.: Nocturia, sleep-disordered breathing, and cardiovascular morbidity in a community-based cohort. *PLoS One* 7: e30969 [Epub ahead of print: 6. Feb 2012; doi:10.1371/journal.pone.0030969]

22



Restless-Legs-Syndrom

Tzonova D et al.: Breakthrough symptoms during the daytime in patients with restless legs syndrome (Willis-Ekbom disease). *Sleep Med* 13 (2012) 151-155

24

DRITTE SEITE

- Jugendliche: Edukationsprogramm P.A.R.T.Y. mindert Risiken 5
- Schlafstörungen: Wenn Polizisten übermüdet sind ... 5
- Rauschgiftlage 2011: 20% weniger Drogentote 5

ANGST-/ZWANGSSTÖRUNGEN

- CME: Zwangserkrankung bei Erwachsenen: Spielen Anti-Basalganglien-Antikörper doch eine Rolle? 6
- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG 6

SCHMERZ/KOPFSCHMERZ

- Myofasziale Schmerzsyndrome: Laserbehandlung effektiver als Ultraschall 7
- Phantomschmerz nach Amputation: Affektive Schmerzkomponente prägt das Therapieergebnis 7
- CME: Spannungskopfschmerz und Migräne: Komplikationsgefahr bei Schwangeren 8
- Kopfschmerz in Europa: Jeder vierte Italiener mit Migräne? 8

MULTIPLE SKLEROSE

- Optimierte Interferon-beta-Therapie: Weniger MS-Läsionen durch Vitamin D₃ 9
- Frühe Therapie des CIS : IFNβ-1a (s.c.) – eine wertvolle Option 9
- Basistherapie und Eskalation: Profitieren die Patienten von dem Switch? 10
- MS-induzierte Spastik: Patientennutzen – ein Medikament und zwei Standpunkte 10

SUCHT

- CME: US-Studie zu Alkohol bei Kindern: Erstkonsum und Binge drinking bei Product-Placement 12
- Einziger vorhandener Risikofaktor: Myokardinfarkt und Schlaganfall durch Cannabis? 12

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

- Major Depression plus Zwangsstörung: Einseitige Kapsulotomie ausreichend? 13
- Depression und Burnout: Escitalopram wirkt nicht nur schnell, sondern auch stark 13
- CME: Unipolare und bipolare Erkrankung: Mit dem Aktivierungsfaktor unterscheiden 14
- Major Depression: Komorbidität beschleunigt Therapiestart 14

EPILEPSIE

- Refraktäre Epilepsie bei Kindern: Ketogene Diät mit geringerem Lipidanteil? 16
- Neue Epilepsie-Leitlinien: Refraktäre Anfälle und Status epilepticus 16

DEMENTIELLE SYNDROME

- Olfaktorischer „Atropin-Stresstest“: Präklinische Alzheimer-Demenz erkennbar? 17
- Therapie der Alzheimer-Demenz: Memantin-Kombination ist deutlich überlegen 17

SCHIZOPHRENIE

- CME: D₂-Rezeptorbesetzung und Kognition: Wie viel ist genug – wie viel ist zu viel? 18
- STENO 18

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

A	Anwendungsbeobachtung	M	Metaanalyse
C	Fall-Kontroll-Studie	R	Randomisiert-kontrollierte Studie
F	Fallbericht	S	Sonstige Studienarten
K	Kohortenstudie	U	Übersicht

PARKINSON-SYNDROME

Trotz Überschneidungen: Apathie und Depression streng unterscheiden! 20

Vigilanz und Kognition bei Morbus Parkinson: PiViCog-Studie: Patienten profitieren von Piribedil 20

SCHLAF

CME: Unabhängig von nächtlicher Atemstörung: Nykturie erhöht kardiovaskuläre Risiken 22

IM FOKUS 22

RESTLESS-LEGS-SYNDROM

CME: Häufiger und schwerer als angenommen: RLS-Durchbruchssymptome am Tage 24

Brennend, stechend, unerträglich...: Diese RLS-Sensationen herrschen vor 24

ADHS

CBT bei Erwachsenen mit ADHS: Mit und ohne Stimulantien erfolgreich 25

Komorbidität bei ADHS: Auch hier steht die Therapie mit MPH ganz oben 25

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

CME: Depression nach Schlaganfall: Frühe Diagnose durch PHQ-9 und -2 26

INTERNET-TIPPS 26

VARIA

Longitudinalstudie zu chronischem Schmerz: Anfälliger für Depression und Angststörungen? 28

Impressum 28

Bestellcoupon 30

FÜR DIE PRAXIS 29

CME: Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen 31