



Sind die neuen Substadien T1m und T1e prädikativ für die Prognose des Urothelkarzinoms? (S. 293)

Referiert und kommentiert

- 287 Leitlinien international: Zwei neue Leitlinien zur Vasektomie und ihre Relevanz für die andrologische Tätigkeit
- 290 An unsere Leser
- 290 Ureterokutaneostomie: Langfristiger Ureterkatheter senkt Stenose-Risiko (mit Kommentar)
- 292 Kurzmitteilung: Interstitielle Zystitis oft unerkannt
- 293 Harnblasenkarzinom: Prognoseabschätzung mit neuen Substadien besser (mit Kommentar)
- 294 Ausschreibung: C. E. Alken-Preis 2012
- 295 Kurzmitteilung: DGU und AUO befürworten aktive PCa-Therapie mit umfassender Aufklärung
- 296 Nierenzellkarzinom: NSAR erhöhen Erkrankungsrisiko (mit Kommentar)
- 298 Kurzmitteilung: Mit körpereigener Abwehr gegen den Nierenzelltumor
- 298 DGU-Studienregister jetzt mit WHO-Akkreditierung
- 299 Buchbesprechung

Tipps und Tricks

- 300 Bildschirm-Steuerung des Kalium-Tatanyl-Phosphat-Lasers durch den Operateur

Klassiker der Urologie

- 301 Jüdische Urologen während des Nationalsozialismus – 5 Biografien aus Leipzig

Klinik und Praxis

- 305 Kommunikation: Schlechte Nachrichten überbringen

Recht in der Praxis

- 311 Gesundheitspolitik: GVK-Versorgungsstrukturgesetz – Herausforderungen und Risiken (Teil 3/3)

- 315 Fragen für den Facharzt

- 317 Medizin und Markt

Übersicht | Review

- 321 ► **Titelthema:** Bildgestützte Prostatastanzbiopsie
Image-Guided Punch Biopsy of the Prostate
M. Seitz, C. Gratzke, C. Stief, D. Tilki
(siehe auch Editorial Comment auf Seite 279)



Titelbild: Farbdoppler-Darstellung eines Prostatakarzinom-Areals (noduläre Auffälligkeit) (S. 323).

Originalarbeiten | Original Papers

- 330 ▶ **Titelthema:** HIFU in der Salvage Behandlung von Patienten mit Prostatakarzinom-Rezidiv nach primärer externer Bestrahlungstherapie – Status 2012
HIFU in Salvage Treatment of Patients with Prostate Cancer after Primary External Radiation Therapy – Status 2012
D. Baumunk, H. Cash, J. Ebbing, M. Porsch, A. Janitzky, J. J. Wendler, U.-B. Liehr, R. Ganzer, A. Blana, M. Schostak

Fallberichte | Case Reports

- 337 Partielle Nephrektomie nach neoadjuvanter Therapie mit Sunitinib ermöglicht den Nierenerhalt bei Einzelniere
Partial Nephrectomy after Neoadjuvant Administration of Sunitinib Facilitates Preservation of a Solitary Kidney
C. von Klot, J. U. Becker, V. Grünwald, I. Peters, M. A. Kuczyk, A. S. Merseburger
- 340 Kontralaterale inguinale Metastase eines seminomatösen Hodentumors
Contralateral Inguinal Metastasis from Testicular Seminoma
S. Rausch, T. Yiakoumos, M. Schieber, K. Özdemir, T. Kälble

Uroonkologie | Urooncology

- 342 ▶ **Titelthema:** PEB beim Hodentumor
PEB Treatment of Testicular Cancer
S. Krege

CME – Zertifizierte Fortbildung

- 347 Gefährdungssituation bei Desinfektionsmitteln
U. Eickmann
- 360 CME-Fragebogen



-
- 362 **Impressum**