




Restless Legs Syndrom

Rizzo G et al.: Low brain iron content in idiopathic restless legs syndrome patients detected by phase imaging. *Mov Disord* 28 (2013) 1886-1890

21



Schizophrenie

Ripke S et al.: Genome-wide association analysis identifies 13 new risk loci for schizophrenia. *Nat Genet* 45 (2013) 1150-1159

22



Kopfschmerz/Schmerz

Chuang CS et al.: Migraine and risk of dementia: a nationwide retrospective cohort study. *Neuroepidemiology* 41 (2013) 139-145

26

DRITTE SEITE

Katastrophale medizinische Versorgung in Syrien: Die Geschichte von einem, der helfen wollte

5

Adipositas auf dem Vormarsch: Fastfood-Konsumenten ohne Augenmaß?

5

Patienten befragt: Plazebo-Effekt nutzen?

5

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

CME: Depressionsschwere und Suizidalität: Negative Kindheitserlebnisse verschlechtern den Verlauf

6

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Kardiovaskuläre Erkrankung bei Depression: Ist doch die Lebensweise entscheidend?

6

Ältere mit Major Depression: Rückfallprophylaxe mit „Erhaltungs-EKT“

8

EPILEPSIE

Schlafstörungen : Viele sind tagsüber extrem müde

9

Lacosamid als Add-on bei fokalen Anfällen: Die Anfallsreduktion hält über Jahre an

9

CME: Evidenzbasierte Empfehlungen der AAN: Update zur Vagusnerv-Stimulation (VNS)! 10

MULTIPLE SKLEROSE

„Venöse Hypothese“ der MS: Fall-Kontroll-Studie widerlegt CSSVI erneut 11

11

Neue Wirkstoffe und veränderte Therapieziele: Dual gegen die MS-Pathologie 11

11

VBM: Fatigue eine Frage der Konnektivität? 12

12

Natalizumab beim ECTRIMS 2013: Wirksamkeit nimmt mit der Therapiedauer zu 12

12

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

Lakunärer Hirninfarkt: Rezidive via Blutdrucksenkung verhindern 14

14

Vorhofflimmern: NOAKs – sicherer Schlaganfallschutz 14

14

IM FOKUS 14

14

SCHMERZ/KOPFSCHMERZ

CAVE: Rotterdam-Studie an älteren Menschen: Vermehrt Mikroblutungen unter Clopidogrel 15

15

Venenthrombosen-Prophylaxe nach Schlaganfall: Pneumatische Kompression ist lästig, aber wirksam 15

15

KONGRESS

Schmerzkongress 23. bis 26. Oktober 2013 in Hamburg 16

16

ECTRIMS 02. bis 05. Oktober in Kopenhagen 17

17

PARKINSON-SYNDROME

CME: Tiefe Hirnstimulation (THS) des STN: Therapieoption auch für frühe Stadien? 18

18

Ungewöhnlicher Fallbericht: Parkinson-Syndrom durch emotionale Krise 18

18

Angst, Depression, Fatigue, Schmerzen: So fluktuieren NMS 19

19

Titelbilder: Fotolia Fotos auf dieser Seite: Fotolia, Mauritius-images

DEMENTIELLE SYNDROME

CME: Fall-Kontroll-Studie: Risikofaktoren für eine DLB 20
 Kognitive Fitness im Alter: Hilft der „NeuroRacer“? 20

RESTLESS-LEGS-SYNDROM

CME: SWI-Bildgebung: Eisenmangel im Gehirn in vivo lokalisiert 21
 Wenn die dopaminerge Therapie versagt: Erste Doppelblindstudie zu Oxycodon/Naloxon 21

SCHIZOPHRENIE

CME: Genom-weite Assoziationsstudie: 13 neue Loci 22
 INTERNET-TIPPS 22

SUCHT

CME: Alkoholkonsum: Klappt das Screening beim Hausarzt? 24
 Internet-Abhängigkeit: Wenn Facebook einem den Schlaf raubt 24

ANGST-/PANIKSTÖRUNGEN

CME: One-Session-Exposition bei spezifischen Phobien: Eine Sitzung reicht – aber wer spricht an? 25
 STENO 25

SCHMERZ/KOPFSCHMERZ

CME: Die Diskussion geht weiter: Demenzrisiko bei Migräne doch erhöht? 26
 Analgesie mit NSAR: Unterschiedliche Risiken 26

ADHS

Komorbide Symptome und exekutive Funktionen: Geschlechterunterschiede bei ADHS 27
 Neue Therapieoption: Lisdexamfetamin zur Zweitlinientherapie zugelassen 27

VARIA

PRIMA-Studie: Polyvalentes Immunglobulin auch bei CIPD erfolgreich 28
 Spinale und paraspinale MP-Injektionen: Der Pilz kam in der Spritze 29
 Morbus Fabry: Frühzeitig erkennen und EET einleiten 29
 Impressum 29
 Bestellcoupon 28
 FÜR DIE PRAXIS 30
 CME: Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen 31

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

A Anwendungsbeobachtung	M Metaanalyse
C Fall-Kontroll-Studie	R Randomisiert-kontrollierte Studie
F Fallbericht	S Sonstige Studienarten
K Kohortenstudie	Ü Übersicht