

JDDDG



JDDG wird herausgegeben von der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG)
(Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen e. V.)

JDDG ist offizielles Organ der
Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) und der
Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (ÖGDV)

... Editorial

- 277 Umbruch an alten Ufern – Ein Fach im Fluss
Rudolf Stadler, Roland Kaufmann

... CME-Artikel

- 283 Prävention von Hauttumoren | Skin cancer prevention
Thomas Körnek, Matthias Augustin

... Review

- 301 Progressive noduläre Histiozytose | Progressive nodular histiocytosis
Olaf Hilker, Alexander Kovneristy, Rita Varga, Thorsten Neubert, Ulrich Wesselmann,
Michael J. Flaig, Thomas Ruzicka, Walter Burgdorf, Percy Lehmann
- 309 Der Lichen ruber planus und seine klinisch-morphologischen Varianten | Clinical variants
of lichen planus
Gunnar Wagner, Christian Rose, Michael Max Sachse

... Originalarbeiten

- 322 Eine schnelle und einfache Methode zur Differenzierung von *Arthroderma benhamiae* und
Microsporium canis | A simple and rapid method to differentiate *Arthroderma benhamiae*
from *Microsporium canis*
Peter Mayser, Debby Budihardja
- 329 Hautbasispflegepraxis in deutschen Pflegeheimen: eine deutschlandweite Querschnittsstudie |
Skin care practice in German nursing homes: a German-wide cross-sectional study
Jan Kottner, Yasmin Rahn, Ulrike Blume-Peytavi, Nils Lahmann

Inhalt

- 338 Therapie der fortgeschrittenen kutanen T-Zell-Lymphome mit nichtpegyliertem liposomalem Doxorubicin – Konsensus der Lymphomgruppe der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie | Treatment of advanced cutaneous T-cell lymphomas with non-pegylated liposomal doxorubicin – Consensus of the lymphoma group of the Working Group Dermatologic Oncology
Chalid Assaf, Jürgen C. Becker, Marc Beyer, Antonio Cozzio, Edgar Dippel, Claus-Detlev Klemke, Peter Kurschat, Michael Weichenthal, Rudolf Stadler
- 348 Histologische Veränderungen in Stammvenen nach der Behandlung mit dem ClariVein®-Verfahren – eine Ex-vivo-Untersuchung | Histology of saphenous veins after treatment with the ClariVein® device – an ex-vivo experiment
Michael Kendler, Marco Averbeck, Jan C. Simon, Mirjana Ziemer

... Correspondence

- 354 Livide Erytheme am Stamm bei Lyme-Borreliose | Livid erythematous patches on the trunk in Lyme borreliosis
Milana Surtov-Pudar, Elisabeth Aberer
- 356 Einfluss der Behandlung mit Bosentan auf die akrale Wiedererwärmung bei Patienten mit systemischer Sklerose | Influence of bosentan on fingertip rewarming in patients with systemic sclerosis
Juliane Autenrieth, Gabriela Riemekasten, Christoph Bert, Margitta Worm

... Diagnosequiz

- 360 Plötzlich aufgetretene, akrolokaliserte Erytheme mit Hyperkeratosen und pityriasiformer Schuppung an Fußsohlen, Fingerspitzen, Nase und Ohrhelices | Sudden onset of acral erythema with hyperkeratosis and pityriasiform scales on soles, fingertips, nose and ear helices
Delnaz Delavari, Maria Zywica, Martin Hartmann

... Forum

- 364 Journal-Club
- 365 Gestern, heute, morgen
- 369 Laudationes
- 370 Nachrufe
-
- 372 Kongresskalender

Abbildung auf der Titelseite

Siehe Beitrag *Progressive noduläre Histiozytose* auf Seite 301 in diesem Heft.

Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe liegen die „Pharma-Nachrichten“, die „Dermatology News“ sowie das Programm der 47. DDG-Tagung bei. Wir bitten um freundliche Beachtung.