

Panorama

8 Meldungen aus Praxis und Forschung

Im Blickpunkt

12 Go-go, Slow-go oder No-go Wie aggressiv soll Krebs im Alter behandelt werden?

Literatur kompakt

17 Alle Studien auf einen Blick

20 Leukämien und Lymphome

22 Myelom: Bortezomib-Konsolidierung nach ASCT
Mellqvist UH et al. Blood. 2013;121:4647-54.
kommentiert von Hartmut Goldschmidt, Heidelberg

24 Tumoren der Lunge

28 Gastrointestinale Tumoren

29 Cetuximab: Kein Nutzen bei Magenkarzinom
Lordick F et al. Lancet Oncol. 2013;14:490-9.
kommentiert von Erhard Hiller, München

32 Mammakarzinom und gynäkologische Tumoren

37 Urogenitale Tumoren

39 Tumoren der Haut

40 Supportivtherapie

42 Allgemeine Onkologie



11 MRT statt PET?

Positronenemissionstomografie gilt als das Bildgebungsverfahren für Tumorstoffwechsel. Studien aus London suggerieren jetzt: das kann auch die Magnetresonanztomografie leisten.



12 Krebsbehandlung im Alter

Sollen über 70-Jährige bei einer Tumorerkrankung dieselbe Therapie bekommen wie 50-Jährige? Ein strukturiertes geriatrisches Assessment ermöglicht es, die Antwort weniger vom chronologischen als vom biologischen Alter des Patienten abhängig zu machen.

Fortbildung

ASORS – Supportivtherapie und Rehabilitation

- 48 Was hilft bei Müdigkeit und Erschöpfung?**
Therapie der Tumor-Fatigue
Irene Fischer, Manfred E. Heim

CME – Zertifizierte Fortbildung

- 54 Candidosen in der Chemotherapie**
Frühzeitig und konsequent behandeln
Pietro Nenoff

Medizin aktuell

- 62 EHA 2013**
Hämatologie im Fokus – neue Daten, neue Fakten
- 67 MASCC 2013**
Supportivtherapie – eine interdisziplinäre Aufgabe
- 69 Senologiekongress 2013**
Brustkrebs – eine Erkrankung mit vielen Aspekten

Praxis konkret

Zukunft der Onkologie

- 73 AMNOG**
Fachgesellschaften fordern mehr Mitspracherecht

IT + Online

- 76 Schlusspfeiff für Windows XP**
Arztpraxen sollten zügig reagieren

Menschen, Ideen, Perspektiven

- 89 Wer ist Petra Ortner?**



48 Therapie der Tumor-Fatigue
Unübliche, starke Müdigkeit und Erschöpfung: vorübergehende Unpässlichkeit über unzureichende Alltagsbewältigung bis hin zur dauerhaften Erwerbsunfähigkeit. Trotz teilweise gravierenden Auswirkungen wird sie oft weder als behandlungsbedürftig noch als -fähig wahrgenommen – obwohl evidenzbasierte Therapiemöglichkeiten bestehen.



62 EHA 2013
Die Jahrestagung der European Hematology Association (EHA) ist die wichtigste Ergänzung des amerikanischen Hämatologen-Kongresses. Dies belegt wieder einmal das breite Spektrum an neuen Daten.