

**Inhalt**

- 2 Impressum**
- 3 Editorial**
- 4 Alemtuzumab bei aktiver schubförmig-remittierender MS – Nachhaltige Reduktion der Schubrate, signifikante Verlangsamung der Behinderungsprogression mit Chancen auf eine EDSS-Besserung**  
*Prof. Dr. Thomas Postert, Paderborn*
- 6 Fall 1:**  
**24-jährige Patientin mit aktiver MS und Alemtuzumab als Ersttherapie**  
*Priv.-Doz. Dr. Kathrin Gerbershagen, Köln*
- 8 Fall 2:**  
**52-jährige Patientin mit Alemtuzumab nach Interferontherapie**  
*Dr. med. Andreas Niebuhr, Münster*
- 10 Fall 3:**  
**38-jähriger Patient mit Alemtuzumab nach Fingolimod**  
*Dr. Martin Schreiber, Herford*
- 12 Fall 4:**  
**27-jährige MS-Patientin mit Alemtuzumab nach umfassender Vorbehandlung**  
*Prof. Dr. med. Thomas Postert, Paderborn*
- 14 Fall 5:**  
**28-jährige Patientin mit aktiver MS und Alemtuzumab nach Interferon-Vortherapie**  
*Prof. Dr. med. Thomas Postert, Paderborn*
- 15 Literatur**