



URO-ONKOLOGIE

150-161 Blasenkrebs

Klinisches Ergebnis bei Patienten mit nicht muskelinvasivem mikropapillärem Blasenkrebs

Kombinierte Chemo-/Hyperthermietherapie bei nicht muskelinvasivem Blasenkrebs

Prostatakarzinom

Frühe Salvage-Strahlentherapie bei biochemischem Rezidiv nach radikaler Prostatektomie

Zielgerichtete fokale Therapie bei organbegrenztem Prostatakrebs

IMPACT Studie: Gezieltes Prostatakrebs-Screening bei Trägern einer *BRCA1*- oder *BRCA2*-Mutation

Active Surveillance bei Prostatakrebs
Zielgerichtete Prostatakrebsbiopsie bringt Epstein-Kriterien auf den Prüfstand

ERG-Expression in Biopsieproben als Marker für erhöhtes Progressionsrisiko

Langfristige Überlebensparameter von PCa-Patienten nach Brachytherapie

Wie effektiv ist die primäre ADT bei lokalisiertem Prostatakrebs?

Venöser Thromboembolismus nach größeren onkologischen Operationen in der Urologie

Nierenzellkarzinom (RCC) mit Tumorthrombus

Einfluss des histologischen Subtyps auf das krebsspezifische Überleben der Patienten

Prostatakarzinom

Assoziation zwischen Prostatavolumen und Tumorpathologie bei radikaler Prostatektomie

Statine bei Prostatakrebs – Einfluss auf PSA-Rezidivrate nach radikaler Prostatektomie

Steht die Vasektomie mit Prostatakrebs im Zusammenhang?

Einflussfaktoren des PSA-Ansprechens auf eine sechsmonatige Testosterontherapie

174 Bericht

Urologische Klinik in Gronau mit neuen OP-Robotern

UROLOGIE

148-149 Offene radikale Prostatektomie = Behandlungsfehler?

ANDROLOGIE

162-165 Testosteron kann entzündlichen Prozessen entgegenwirken

Plötzlicher Herztod und Sexualhormonspiegel

Selbsteinschätzung von Gesundheit und Lebensqualität bei älteren Männern von Sexualhormonen abhängig

Kongressberichte

166-169 Empfehlung für Radium-223 bei Knochenmetastasen in der Erst- und Zweitlinientherapie

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Andrologie

172-173 66. DGU-Kongress: Demografischer Wandel als urologische Herausforderung

Aktualisierung der Interdisziplinären S3-Leitlinie zum Prostatakarzinom

178 Jungensprechstunde

Mit Recht an Ihrer Seite

170-171 Intimes Verhältnis zu Patienten muss tabu bleiben

Pharmaforum

173-179 PDE5-Hemmer bei erektiler Dysfunktion: Wirken alle gleich?

mRCC: In der Erstlinientherapie wird der Tyrosinkinase-Inhibitor Pazopanib bevorzugt

Hormon- plus Chemotherapie verlängert Überlebenszeit

SWITCH-Studie weist auf ein signifikant längeres Überleben älterer Patienten bei Erstlinienbehandlung mit Sorafenib hin

mRCC: In jeder Linie den Klassenbesten wählen

Neutropenien als limitierenden Faktor begrenzen

Impressum

179