

ARS MEDICI

Diabetes mellitus

Sitagliptin im Vergleich mit anderen Antidiabetika

Wie wirkt sich der DPP-4-Hemmer auf Hospitalisationsrate und Mortalität aus?

Moderne Therapie des Typ-2-Diabetes in 3 Schritten

Schlafräuber bei Diabetes mellitus

Apnoen, Depressionen, Nykturie ...

Hypoglykämien vermeiden heisst kardiovaskuläre Komplikationen vermeiden

Einmal wöchentliche Dosierung bei allen Subgruppen wirksam

Post-hoc-Analyse zu retardiertem Exenatid bei Diabetes Typ 2

Vitamin D

Tiefere Vitamin-D-Spiegel sind mit Depressionen assoziiert

Studie bei geriatrischen Patienten in der Allgemeinpraxis

Vitamin-D-Insuffizienz schadet Mutter und Kind

Metaanalyse von Beobachtungsstudien zu Schwangerschaftsverlauf und Neugeborenen

Cholesterin

Statine und Ezetimib zur Cholesterinsenkung

Ist die Kombinationstherapie tatsächlich sicher?

Schilddrüse

Subklinische Schilddrüsenfunktionsstörungen

Die Diskussion über Therapiebedürftigkeit und Grenzwerte geht weiter

