

schlusskriterien für eine „homogenisierende Vorselektion“ der Studienteilnehmer sorgen und die Fallzahlen aus ethischen und finanziellen Gründen möglichst klein gehalten werden müssen.

Gerade solche Informationen bekommen in einer Zeit, in der der „zweite Gesundheitsmarkt“ boomt, in dem der Nutzer direkt gesundheitsrelevante Produkte und Dienstleistungen kaufen muss, eine neue, wichtige Bedeutung. Schließlich erhebt sich für jeden von uns, egal ob im Elektrofachhandel oder in der Apotheke die Frage: „Was kann ich für mein Geld erwarten?“

Was wir brauchen, ist keine Diskriminierung von allem, was nicht RCT heißt, sondern das exakte Gegenteil. Auch die Methodik der randomisiert kontrollierten Studie konnte sich nur zum Goldstandard für die „effects of health care“ entwickeln, weil sie von Methodikern ernst genommen, professionell angewendet und auf der Basis konkreter Erfahrungen weiterentwickelt wurde. Eine Renaissance der guten alten Anwendungsbeobachtung ist mehr als überfällig im Zeitalter der Value Based Medicine [4]!

*Karl-Ludwig Resch,
Bad Elster*

Quellen

- 1 Cochrane AL (1931–1971). A critical review, with particular reference to the medical profession. In: Medicines for the Year 2000. London: Office of Health Economics, 1979: 1-11
- 2 Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. Brit Med J 1996;312:71-72
- 3 Anselm E. Unsere Erfahrungen mit Prontosil bei Puerperalfieber. Dtsch Med Wochenschr 1935;61:264
- 4 Brown MM, Brown GC, Sharma S. Evidence-Based to Value-Based Medicine. Chicago: American Medical Association Press, 2005

ORIGINALARBEIT

- Diabetes mellitus Typ 2: Therapieumstellung von Metformin/Sitagliptin auf Metformin/Vildagliptin führt zu klinischer Verbesserung** 39
U. D. Stephan

ÜBERSICHTSARBEIT

- Pegfilgrastim und Lipegfilgrastim: Ein kurzer pharmakologischer Vergleich** 42
S. Böhm

AKTUELLE THERAPIEKONZEPTE FÜR DIE PRAXIS

- Fortschritte für mCRPC-Patienten: Abirateronacetat bewährt sich im klinischen Alltag** 45
- Tuberöse Sklerose – eine Krankheit mit vielen Gesichtern** 48
- Hyperhidrose bei Systemerkrankungen: Methantheliniumbromid mindert Leidensdruck** 53
- Adalimumab plus MTX: Neue Perspektiven in der Kombinationstherapie der rheumatoiden Arthritis** 54
- Eisenchelation bei MDS- und Thalassämie-Patienten** 56

NEUE UND BEWÄHRTE ARZNEIMITTEL

- Talimogen Laherparepvec verringert Tumorgroße bei metastasiertem malignem Malignom** 59
- Afatinib – eine neue Option für die Therapie des fortgeschrittenen NSCLC mit EGFR-Mutationen** 60
- Frühdiagnose der rheumatoiden Arthritis mit dem Rheumascan-Verfahren** 63
- Eziclen® zur Darmreinigung: Mehr Sicht, mehr Sicherheit** 64

RUBRIKEN

- Wissenswertes Kongresse** 44, 52, 70
66