

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Kolorektales Karzinom</b>	
<i>Neue klinische Routine: Erhaltungstherapie mit Capecitabin plus Bevacizumab bei metastasiertem kolorektalem Karzinom</i>	<b>1</b>
<i>Neue Daten zu intensivierter Therapie mit Antikörpern</i>	<b>3</b>
<i>FIRE-3-Studie – mehr Fragen als Antworten</i>	<b>4</b>
<b>Bronchialkarzinom</b>	
<i>Auch bei älteren NSCLC-Patienten: First line mit Carboplatin plus Bevacizumab plus Pemetrexed</i>	<b>6</b>
<i>OS-Daten zur Erhaltungstherapie mit Bevacizumab und Pemetrexed beim NSCLC</i>	<b>7</b>
<b>Zervixkarzinom</b>	
<i>Signifikanter Überlebensvorteil beim Zervixkarzinom</i>	<b>8</b>
<b>Mammakarzinom</b>	
<i>Frühes Mammakarzinom: Carboplatin im neoadjuvanten Konzept</i>	<b>9</b>
<b>Ovarialkarzinom</b>	
<i>Länger ohne Progress bei besserer Lebensqualität</i>	<b>11</b>