

Inhalt

► Schwerpunkt Diabetes

Gewichtsreduktion schützt nur dauerhaft	Seite 2
Intensive Therapie kann schaden	Seite 3
Gewichtszunahme	Seite 4
Besserer AKQ mit Blutdruckziel unter 130 mmHg	Seite 4
Exenatid als Alternative zu Mahlzeiteninsulin	Seite 6
Geringerer Insulinbedarf problematisch	Seite 7
Empagliflozin gut für Zweitlinie	Seite 7
Kultur ohne Infektion nutzlos	Seite 8
Prädiktoren für insulinbedingte Gewichtszunahme identifiziert	Seite 9
Bessere Einstellung	Seite 9
HbA _{1c} viermal pro Jahr messen	Seite 10

► Schilddrüse

TPO-AK unbedeutend für KHK-Risiko	Seite 7
Studie bestätigt Assoziation nicht	Seite 8
Mütterliche Therapie mit Folgen fürs Kind	Seite 8
Sozioökonomische Konsequenzen	Seite 10

► Kardiometabolische Erkrankungen

Invers mit Melatoninproduktion assoziiert	Seite 2
Albuminurie guter Prädiktor	Seite 2
Anstieg des zerebrovaskulären Risikos	Seite 6
Statine machen ältere Männer müder	Seite 10

► Onkologie

NET: Unterschiede zwischen Männern und Frauen	Seite 4
Mit dem BMI steigen auch die Krebszahlen	Seite 7
Denosumab senkt Kalziumspiegel	Seite 8

► Osteoporose

Estradiol und MP heben Knochendichte an	Seite 3
Statine und Vitamin D interagieren positiv	Seite 4

► Sonstiges

Kochsalzbelastungstest besser im Sitzen	Seite 2
Pasireotid senkt erfolgreich Cortisol	Seite 3
Prävalenz von Übergewicht und Adipositas	Seite 3
Medikamentöse Kontrolle vorteilhaft für Blutdruck	Seite 6
Somatropin verbessert Wachstum	Seite 6
Leuprolidacetat-3-Monatsdepot langfristig wirksam	Seite 9
Niedriger Vitamin-D-Status senkt Lebensqualität	Seite 9
Gesundheitsbezogene Lebensqualität	Seite 10

► Forschung, Hochschule & Verbände.....	Seite 12
---	----------

► Industrie.....	Seite 13
------------------	----------

► Termine.....	Seite 15
----------------	----------