

Arzneimitteltherapie

Unabhängige Informationen zur Pharmakotherapie

Editorial

Martin Griesshammer, Minden

- Quo vadis Onkologie?** 329
Krebsbehandlung ohne Chemotherapie?

Übersicht

Clemens Unger, Freiburg

- Fortschritte in der Therapie der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL)** 330

Brigitte Hübner, Halle (Saale)

- Therapie des multiplen Myeloms im Wandel** 336



- Zertifizierte Fortbildung** 341

Klinische Studie

Rezidiertes multiples Myelom

- Elotuzumab verlängert progressionsfreies Überleben** 343

Referiert & kommentiert

- Aus Forschung und Entwicklung** 344

Familiäre Hypercholesterolämie: CETP-Hemmer senkt LDL-Cholesterol, klinischer Nutzen bleibt abzuwarten – Arterielle Hypertonie: Folsäure in der Primärprävention des Schlaganfalls

- Therapiehinweise** 345

Patienten mit Vorhofflimmern: Ist Digitalis therapeutische Option oder Risiko? – Duale Thrombozytenfunktionshemmung nach Myokardinfarkt: Ticagrelor wirkt langfristig prophylaktisch, aber erhöht das Blutungsrisiko – Akuter ischämischer Insult: Alteplase versus Tenecteplase zur Thrombolyse – Schlaganfallprävention: Antikoagulation oder Thrombozytenfunktionshemmer bei Patienten mit Dissektionen hirnversorgender Arterien? – Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern: Gastrointestinale Blutungen unter Dabigatran, Rivaroxaban und Warfarin gleich häufig – Frühes Mammakarzinom: Bisphosphonate verbessern Prognose bei postmenopausalen Frauen

- Kongresse, Symposien, Konferenzen** 351

HER2-positiver Brustkrebs: Kein PFS-Vorteil für T-DM1 im Vergleich zum bisherigen Therapiestandard, aber weniger Toxizität – HR⁺ und HER2⁻ fortgeschrittenes Mammakarzinom: Doppelt so lange progressionsfrei leben mit Palbociclib – Rezidiertes und refraktäres multiples Myelom: Doppelt so langes PFS mit Carfilzomib

im Vergleich zu Bortezomib – Rituximab-refraktäre indolente Non-Hodgkin-Lymphome: Obinutuzumab verlängert die Remissionszeit – Fortgeschrittene Weichteilsarkome: Längeres Gesamtüberleben mit Eribulin – Metastasiertes kolorektales Karzinom: Hinweise auf eine Überlebenszeit von vier Jahren unter Anti-EGFR-Therapie – Übelkeit und Erbrechen unter Chemotherapie: Dreifachtherapie zur Antiemese bei Carboplatin-haltigen Regimen einsetzen – Nicht-Plattenepithel-NSCLC: Nivolumab verlängert Überleben um 10 Wochen – ALK-positives nichtkleinzelliges Lungenkarzinom: Ceritinib wirkt noch bei TKI-vorbehandelten Patienten – Plattenepithelkarzinom der Lunge: Längeres Überleben mit Afatinib – Hepatitis C: C-EDGE: Grazoprevir/Elbasvir erfolgreich auch bei vorbehandelten, HIV-koinfizierten Zirrhose-Patienten und bei HCV-Patienten mit Niereninsuffizienz

Notizen

367

Wichtige Mitteilungen von EMA, FDA, BfArM und AkdÄ

Impressum

368