

URO-ONKOLOGIE

- 178-186** Dynamisches Modell der Beziehung zwischen Testosteron und Prostatakrebsentwicklung
- „PSA-Pyramide“ als Screening-Strategie für Männer mit initialem PSA-Wert ≤ 3 ng/ml
- Bestätigung der Exaktheit des 4Kscore bei der Identifizierung von Gleason ≥ 7 -Prostatakrebs
- Komplikationsraten bei PCa-Patienten nach radikaler Prostatektomie oder Strahlentherapie
- mCRPC: Krankheitsergebnisse bei „jüngeren“ Männern
- Das metastasierte Prostatakarzinom: Ende der Sequenztherapie?
- MALE Studie – weltweit erste Studie für Männer mit Brustkrebs
- Mistelextrakt als intravesikale Instillation bei Patienten mit oberflächlichem Harnblasenkrebs
- Hochrisiko-nicht-muskelinvasiver Blasenkrebs
Bacillus-Calmette-Guérin-Induktionstherapie mit versus ohne Erhaltungstherapie über 3 Jahre
- Urothelkarzinom des oberen Harntrakts
Nierenfunktion nach radikaler Nephroureterektomie und partieller Ureterektomie
- Optimale Therapieplanung bei Darmkrebs
- Prostatakarzinom
Ein Drittel weniger Biopsien mit neuem Screening-Algorithmus
- Metastasiertes Nierenzellkarzinom
Einfluss von Lymphknotenmetastasen bei Behandlung mit targeted Therapien
- Kleine Nierentumoren
Vergleich des Erhalts der Nierenfunktion unter Überwachung und nach Intervention

Mit Recht an Ihrer Seite

- 200-201** Mit Erbrecht hat irgendwann jeder zu tun – Rechtzeitige Gestaltung ist für Erblasser und Erben wichtig

Kongressberichte

- 206-207** 27. Kongress der Deutschen Kontinenz Gesellschaft
- Inkontinenz: Neue Standards für eine bessere Versorgung
- Harninkontinenz nach Prostatektomie
- OAB – wirksame Therapien

UROLOGIE

- 188-193** BPS-Therapie – Neue Leitlinien
- Ganzheitliche Therapie hilft Frauen mit Inkontinenz
- Detrusor-Überaktivität nach Laser-Enukleation der Prostata
- Erhöhte Risiken für Paraplegie-/Tetraplegie-Patienten bei perkutaner Nephrolithotomie
- Adhärenz-Defizite beeinflussen den Verlauf der BPH-Erkrankung
- Peniler Manschetten-Test vs. Druck-Fluss-Studie bei Patienten mit Blasenaustrittsobstruktion
- Embolisation der Prostata-Arterie vs. offene Prostatektomie bei benigner Prostataobstruktion

ANDROLOGIE

- 194-199** Kinderwunsch bei Hypogonadismus: Isomer von Clomid in der Prüfung
- Zusammenhang zwischen Testosteronausgleich und thrombotischen Ereignissen
- Longitudinale Beziehungen zwischen reproduktiven Hormonen und kognitivem Abbau
- Einfluss von Testosteron auf die kognitive Funktion bei älteren Männern
- Kognitive Einbußen bei PCa-Patienten unter ADT
- Testosteronausgleich bei Schmerzpatienten mit Opioid-induziertem Hypogonadismus
- Gesundheitszustand HIV-infizierter Männer mit niedrigem Serum-Testosteronspiegel

Pharmaforum / Meldungen

- 203-205** Transdermales Testosteron wohl sicherer für Herz und Gefäße
- Osteoprotektion beim Prostatakarzinom mit Knochenmetastasen
- Neue S3-Leitlinie Nierenzellkarzinom: Höchste Evidenz für Sunitinib, Temozolomid und Axitinib
- Metastasiertes Prostatakarzinom
Taxan-Chemotherapie gewinnt immer stärker an Bedeutung