

Inhaltsverzeichnis

Vorwort		1
Schwerpunktthema		4
Schwerpunktthema I	Geschlechtsspezifische Unterschiede im Outcome nach endovaskulärer Therapie der iliakalen und femoropoplitealen Strombahn	4
	Einleitung	4
	Methoden	4
	Ergebnisse	6
	Diskussion	9
Schwerpunktthema II	Geschlechtsspezifische Befunde in der Kapillarmikroskopie	11
	Geschlechtsspezifische kapillarmikroskopische Befunddifferenzen in der „Normalbevölkerung“	11
	Geschlechtsspezifische kapillarmikroskopische Befunddifferenzen bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen	12
	Ausblick	12
Praxis		14
Praxis	Akute tiefe Beinvenenthrombose	14
	Ursachen	14
	Epidemiologie	14
	Diagnostik	15
	Therapie	16
	Medizinischer Tipp – Hausarzt	17
	Organisatorischer Tipp – Hausarzt	17
	Medizinischer Tipp – Spezialpraxis	18
	Organisatorischer Tipp – Spezialpraxis	18
Der aktuelle Fall	Interventionelle Versorgung pulmonal-arteriovenöser Malformationen bei rezidivierenden Lungenblutungen und Morbus Osler (hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie)	20
	Einleitung	20
	Aktueller Fallbericht	20
	Kommentar	23
Wie hätten Sie entschieden? Fall I	Vena-cava-superior-Syndrom	24
	Welche therapeutische Entscheidung hätten Sie getroffen?	25
	Getroffene Entscheidung und Begründung	25
Wie hätten Sie entschieden? Fall II	Infrarenal Aortenthrombus mit arterieller Embolie	27
	Kasuistik	27
	Vorerkrankungen	27
	Diskussion	29

Lifestyle	Ein tägliches Glas Rotwein und eine Lebensstiländerung haben bei Patienten mit einer Arteriosklerose der Karotis nach 4 und 20 Wochen keinen Effekt auf den arteriellen Blutdruck und die Herzfrequenz	32
	Einführung	33
	Methoden	34
	Ergebnisse	35
	Diskussion	35
Therapie und Praxis	Akute und chronische mesenteriale Verschlusskrankheit	40
	Akute mesenteriale Ischämie	40
	Chronische mesenteriale Verschlusskrankheit	42
Interventionelle Phlebologie	Lungenembolie	48
	Definition und Klassifikation	48
	Quellen pulmonaler Thromboembolien	48
	Epidemiologie	48
	Klinik	49
	Diagnostik	51
	Allgemeine Therapieprinzipien	51
Für Sie gelesen		52
	Langzeitergebnisse der direkten und indirekten offen-chirurgischen isolierten „Below-knee“-Revaskularisation, basierend auf dem Angiosomenkonzept bei Diabetikern mit kritischer Extremitätenischämie	52
	Ein perioperatives Management mit Thrombozytenfunktionshemmern und Statinen ist mit einer niedrigeren Mortalität nach einem gefäßchirurgischen Eingriff assoziiert	53
	Intrakranielle Stentangioplastie atherosklerotischer Stenosen	54
News		57
	Gefäßmedizin in den Medien	57
	Impressum	60
	Fortbildungskalender	61
	Autoren der Beiträge	62
	Editorial Board	64