

Neue Arzneimittel

AMT Beilage Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Dr. Ernst Mutschler Frankfurt/Main
Redaktion: Dr. Monika Neubeck (verantwortlich)

50 MONOKLONALER VEGF-REZEPTOR-2-ANTIKÖRPER

Ramucirumab


Fortgeschrittene Adenokarzinome des Magens oder des gastroösophagealen Übergangs können mit dem monoklonalen Antikörper Ramucirumab (Cyramza®) als Zweit-Linien-Therapie behandelt werden. Der Angiogenese-Hemmer ist in Kombination mit Paclitaxel oder als Monotherapie für Patienten zugelassen, für die eine Kombinationstherapie mit Paclitaxel nicht geeignet ist.



53 PHOSPHODIESTERASE-4-HEMMER

Apremilast

Der niedermolekulare Phosphodiesterase-4(PDE-4)-Hemmer Apremilast (Otezla®) bewirkt nach peroraler Verabreichung einen Anstieg der intrazellulären Konzentration von cAMP. Die Substanz ist zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Psoriasis-Arthritis oder mittelschwerer bis schwerer chronischer Plaque-Psoriasis geeignet, die auf Standardtherapeutika unzureichend angesprochen haben oder bei denen eine solche Therapie kontraindiziert ist bzw. nicht vertragen wurde.



56 ERSTES GENTHERAPEUTIKUM

Alipogentiparvovec

Alipogentiparvovec (Glybera®) wird zur Behandlung von familiärer Lipoproteinlipase-Defizienz (LPLD) angewendet, wenn trotz fettarmer Ernährung schwere oder multiple Pankreatitis-Schübe aufgetreten sind. Die Applikation erfolgt einmalig und sollte auf Patienten mit nachweisbaren Mengen an LPL-Protein beschränkt bleiben.

