




Eine mütterliche Depression in der Schwangerschaft erhöht das Depressionsrisiko der Kinder im frühen Erwachsenenalter. Offenbar hat ein Missbrauch der Kinder einen deutlichen Einfluss.

Seite 9

Plant DT et al.: Maternal depression during pregnancy and offspring depression in adulthood: role of child maltreatment. Br J Psychiatry 2015;



In einer großen populationsbasierten Studie erhöhte die pränatale Exposition gegenüber Alkohol und Zigarettenrauch das ADHS-Risiko der Kinder – auch das Passivrauchen der Mutter.

Seite 22

Han JY et al.: The effects of prenatal exposure to alcohol and environmental tobacco smoke on risk for ADHD: a large population-based study. Psychiatry Res 2015; 225(1-2): 164-8

DIE DRITTE SEITE

Untersuchung Berlin Mitte: Arme Nachbarn und die psychische Gesundheit

Ethische Probleme und Risiken: Familie und Freunde selbst behandeln?

Von Piloten und Ärzten: PTBS und Depression

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

► **CME:** Prophylaxe depressiver Episoden: MBCT der Antidepressiva-Therapie überlegen?

Depression in der Schwangerschaft: Wird auch der Nachwuchs depressiv?

Depression und Alkoholabhängigkeit: Neue Therapieoptionen machen Hoffnung

PARKINSON-SYNDROME

Tagesmüdigkeit bei Parkinson-Patienten: Was bringt die Epworth Sleepiness Scale (ESS)?

Zusatztherapie bei M. Parkinson: Dualer Wirkmechanismus für mehr ON-Zeit

SUCHT

► **CME:** Nikotinabhängigkeit und Entzugssymptome: Psychomotorische Unruhe beachten

MULTIPLE SKLEROSE

Fatigue bei MS-Patienten: Umfassende Beeinträchtigungen nachgewiesen

Neuer Leitfaden zur MS-bedingten Spastik: Diagnose und Therapie werden erleichtert

Große Nordlandstudie: MS-Inzidenz hat sich verzehnfacht

Orale Therapie mit Fingolimod – AAN 2015: Viele Patienten erreichen NEDA-4

14

6 SCHIZOPHRENIE

► **CME:** Bildgebung bei Schizophrenie: Neuroanatomische Korrelate der Angst

18

► **CME:** Mortalität bei Patienten mit Erstpsychose: Vor allem unnatürliche Tode sind häufiger

18

ADHS

8 ADHS plus Substanzmissbrauch: Weniger Rückfälle durch Pharmakotherapie

20

9 Lisdexamfetamin für Kinder und Jugendliche: Auch Funktionalität und Lebensqualität bessern sich

20

9 Hund-therapie verstärkt CBT-Erfolg

21

Langwirksames Methylphenidat: Positives langfristiges Outcome gesichert

21

10 ► **CME:** ADHS des Nachwuchses: Alkohol und Passivrauchen erhöhen das Risiko

22

10 EPILEPSIE

► **CME:** Antiepileptika-Therapie: Häufigste Nebenwirkungen bei Kindern

24

12 CAVE: Paradoxe Exazerbation unter Levetiracetam: Myoklonisch-astatische Anfälle bei Kindern verstärkt

25

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------------|
| 13 | ▣ Anwendungsbeobachtung | ▣ Metaanalyse |
| 13 | ▣ Fall-Kontroll-Studie | ▣ Randomisiert-kontrollierte Studie |
| 14 | ▣ Fallbericht | ▣ Sonstige Studienarten |
| | ▣ Kohortenstudie | ▣ Übersicht |

INHALT



Standards zur Diagnose und Therapie des RLS stellte jüngst eine Arbeitsgruppe der American Academy of Sleep Medicine (AASM) vor.

Seite 26

Trotti LM et al.: Quality measures for the care of adult patients with restless legs syndrome. *J Clin Sleep Med* 2015; 11(3): 311-34

RESTLESS-LEGS-SYNDROM

American Academy of Sleep Medicine: Standards der RLS-Diagnose und -Therapie (I)	26
CAVE: RLS durch Mirtazapin induziert	26

DEMENZIELLE SYNDROME

► CME: Review und Metaanalyse zur Demenz: Wie wirksam und sicher sind atypische Antipsychotika?	28
--	-----------

KONGRESS

67. Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN)	30
--	-----------

VARIA

Fibromyalgie-Syndrom: O ₂ wirkt auf Symptome und die Hirnaktivität	32
Komplexproteinreies BoNT: Incobotulinumtoxin A: Erfahrungen aus zehn Jahren	32

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

► CME: Drei Monate nach Schlaganfall: Bei Apathie auf Suizidalität achten	33
--	-----------

SITE-SEEING	8
BESTELLCOUPON	12
FORSCHUNG & ENTWICKLUNG	21
IM FOKUS	22
STENO	24
MED-INFO	34
IMPRESSUM	33
► CME Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen	35