



Sind Epilepsie-Patienten vermehrt an Verkehrsunfällen beteiligt? Sind die Restriktionen zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr berechtigt?

Seite 13

Naik PA et al.: Do drivers with epilepsy have higher rates of motor vehicle accidents than those without epilepsy? *Epilepsy Behav* 2015; 47: 111-4



Detaillierte Ultraschalluntersuchungen bei Parkinson-Patienten zeigen, dass eine „Frozen shoulder“ mit erhebliche motorischen Beeinträchtigungen nach UPDRS einhergeht.

Seite 24

Chang YT et al.: Clinical features associated with frozen shoulder syndrome in Parkinson's disease. *Parkinsons Dis* 2015; 232958 [Epub 9. Juni; doi: 10.1155/2015/232958]

DIE DRITTE SEITE

Drastischer Rückgang der Hilfgelder: Iraks Gesundheitssystem vor dem Aus

6

Metaanalyse zur Homöopathie – Globuli gut für gar nichts?

6

DEMENZIELLE SYNDROME

► **CME:** Pflege von Demenzkranken: Welche Angehörigen werden depressiv?

MULTIPLE SKLEROSE

Hirnatrophie-Rate bei MS: Vorschlag für Grenzwerte aus Italien

Auf die Krankheitsaktivität angepasste Therapie: Lebensqualität in den Vordergrund stellen

Große skandinavische Registerstudie: Erhöht die qHPV-Impfung das MS-Risiko?

Vier Jahre Fingolimod: Anhaltende Kontrolle der MS-Kernparameter

Herausforderungen in der MS-Therapie: Gute Erfahrungen mit 3-mal wöchentlich GA40

EPILEPSIE

► **CME:** Fahreignung von Patienten mit Epilepsie: Häufiger in Verkehrsunfälle verwickelt?

► **CME:** Lebensqualität Epilepsie-kranker Kinder: Welcher Einfluss ist am stärksten?

SUCHT

► **CME:** Vareniclin bei Nikotinabhängigen: Wirklich Suizid, Psychose und Straftaten als Nebenwirkung?

ADHS

Randomisierte kontrollierte Studie: Hilft die multimodale ADHS-Therapie jungen Müttern und den Kindern?

Kinder und Jugendliche: Dexamfetamin: eine gute Second-line-Therapie

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

Antidepressiva-Effekte: Gesunde Mutter, glückliches Kind? **17**

► **CME:** CAVE: Suizidalität unter Antidepressiva: Besonders auf jüngere Frauen achten! **17**

Nicht-Ansprechen bei Major Depression: TMS könnte die therapeutische Lücke schließen **18**

KONGRESS

8 1. Kongress der European Academy of Neurology (EAN), 20.–24. Juni 2015 in Berlin **20**

SCHIZOPHRENIE

10 ► **CME:** Nach psychotischer Erstepisode: Diese Faktoren beeinflussen die Remission **22**

10 STRIDE-Intervention bei Antipsychotika-Therapie: Gewicht reduziert, bessere metabolische Werte **22**

PARKINSON-SYNDROME

11 ► **CME:** Sono-Befunde bei Frozen shoulder: Korrelation mit der gesamten Motorik **24**

12 Im Frühstadium: Kognition bei Frauen besser erhalten **24**

Fall-Kontroll-Studie: Parkinson durch Luftverschmutzung? **26**

Opioid-Fixkombination lindert Schmerzen **26**

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

13 ► **CME:** Symptomatische Vertebralis-Stenosen: Doch lieber keine Stents einsetzen? **28**

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:

- | | |
|--------------------------------|--|
| A Anwendungsbeobachtung | M Metaanalyse |
| G Fall-Kontroll-Studie | R Randomisiert-kontrollierte Studie |
| F Fallbericht | S Sonstige Studienarten |
| K Kohortenstudie | U Übersicht |



Lohnen sich Stents bei symptomatischen Vertebralis-Stenosen oder reichen Medikamente allein auch? Dies wurde in der Phase-II-Studie VAST untersucht.

Seite 28

Compter A et al.: Stenting versus medical treatment in patients with symptomatic vertebral artery stenosis: a randomised open-label phase 2 trial. *Lancet Neurol* 2015; 14(6): 606-14

SCHMERZ / KOPFSCHMERZ

► **CME:** Analgetika-Kopfschmerz: Lebensqualität prädiziert
Therapieerfolg **30**

SCHLAF

Komplexe Pathophysiologie: Wie entsteht eine Insomnie? **31**

Internet-Befragung im UK: Auch Z-Drugs haben
Missbrauchspotenzial **31**

Sitzen vor dem Fernseher – Nachtschlaf gestört,
OSA-Risiko erhöht **31**

VARIA

IPT bei posttraumatischer Belastungsstörung: Reexposition
doch nicht zwingend notwendig? **32**

Methylentetrahydrofolat-Reduktase-Mangel: Frühe Betain-
Therapie reduziert nicht nur die Patientensterblichkeit **32**

PERIPHERE ERKRANKUNG

CIDP: IVIg mit Dimer-Messung optimieren? **33**

Supportive Gabe der Kombination von UMP und Nährstoffen:
Studie bestätigt Effektivität bei Wirbelsäulen-Syndromen **33**

STENO **8**

SITE-SEEING **14**

IM FOKUS **28**

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG **30**

BESTELLCOUPON **12**

IMPRESSUM **25**

MED-INFO **34**

► CME Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen **35**