

*Ob ein medikamentöser Abort „erfolgreich“ war, kann die Patientin auch alleine feststellen – mit einem simplen Test*

**Seite 8**

Blum J et al.: Randomized trial assessing home use of two ...  
Contraception 2016; 94: 115-21

*Vorzeitiger Blasensprung nahe am Termin? Neue Daten zeigen das beste Vorgehen*

**Seite 20**

Morris JM et al.: Immediate delivery compared with expectant management after preterm pre-labour rupture of the membranes close to term (PPROMT trial ... Lancet 2016; 387: 444-52

**DIE DRITTE SEITE**

- Mammogramme beurteilen: Reihenfolge ist egal
- Arzt-Haftpflichtdaten ausgewertet: Wer macht am meisten Kunstfehler?
- Mobiquette im Krankenhaus: Packt die Smartphones weg!

**KONTRAZEPTION**

- Chronische rheumatische Erkrankungen: Verhütung für betroffene Jugendliche
- Drospirenon versus Levonorgestrel: Weniger arterielle Thromboembolien
- Patientenzentrierte Versorgung: Bessere Kontrazeption durch Kommunikation
- Verhütungssicherheit von DMPA: In der Praxis nur mittelmäßig
- Medikamentöser Abort: Wirkung verifizieren

**ENDOKRINOLOGIE**

- Adipositas begünstigt Krebsentstehung: Bei dicken Frauen eher an Endometriumkarzinom denken
- Leptin: Appetitzügler als Serummarker für Schmerzen

**FERTILITÄT**

- **CME:** Allogene Oozytentransplantation – Fremde Eizellen erhöhen das Präeklampsierisiko – aber nicht nur das

**SEXUALMEDIZIN**

- Hohes Risiko bei weiblichen US-Veteranen: Hysterektomie nach sexuellem Übergriff

**DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE:**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>A</b> Anwendungsbeobachtung | <b>M</b> Metaanalyse                       |
| <b>C</b> Fall-Kontroll-Studie  | <b>R</b> Randomisiert-kontrollierte Studie |
| <b>F</b> Fallbericht           | <b>S</b> Sonstige Studienarten             |
| <b>K</b> Kohortenstudie        | <b>U</b> Übersicht                         |

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr: Physio, Biofeedback, Wärme und mehr **12**

**GRAVIDITÄT**

- **CME:** Hepatitis-B-Infektion – Mutter-Kind-Transmission stoppen **14**
- Zika-Infektionen: Schwangere nach Reisezielen fragen **15**
- Neonatale Komplikationen: Betamethason auch bei später Frühgeburt **16**
- Präeklampsie: Biomarker steigern Vorhersagegenauigkeit **16**
- Restless-Legs-Syndrom (RLS) in der Schwangerschaft – Niedrige Hämoglobin-Werte erhöhen das Risiko **17**
- Schwangerschaftshypertonie: Kein Vorteil für Labetalol gegenüber Nifedipin **18**
- Monochoriale Zwillinge – schwere Folgen: Nach selektivem Fetozid überlebender Zwilling häufiger entwicklungsverzögert **18**
- Schneller Nikotinverzicht schützt vor Frühgeburt **18**

**GEBURTSHILFE**

- **CME:** Neue Studie liefert Daten zum besten Vorgehen – Vorzeitiger Blasensprung nahe am Termin: Warten oder sofort entbinden? **20**

**MENOPAUSE**

- Perimenopausale Depressionen: Östrogene als First-line-Therapie? **22**
- Postmenopausale Frakturen: Welche Prophylaxe bringt am meisten? **22**
- Osteoporose: Positive Nutzen-Risiko-Bilanz auch nach langjähriger Alendronat-Therapie **22**

**GENITALTRAKT**

- **CME:** Abnorme Uterusblutungen bei fertilen Frauen – Konservative Therapie ist oft erfolgreich **24**
- Pathogenese der Endometriose: Angetrieben von Darmbakterien? **25**
- Entzündung nach Uterusembolisation: Dexamethason hilft **25**

## INHALT

*Senologie-Kongress 2016:  
Bewegung gegen Krebs – Oligo-  
versus Polymetastasierung –  
sexuelle Dysfunktion verschlech-  
tert Adhärenz*

**Seite 27**

### **ONKOLOGIE**

Tumorstadium beim Ovarialkarzinom: Es hängt nicht von Diagnoseschnelligkeit ab	<b>26</b>
Hohe Treffsicherheit beim Ovarialkarzinom: Verfeinerte „Simple Rules“	<b>26</b>
Krebs-Sterblichkeit verringern: Nur 2,5 Stunden Sport pro Woche genügen	<b>28</b>
Gestationsbedingte trophoblastäre Neoplasien: Nach Schwangerschaft oft neue Mole	<b>28</b>
Endometriumkarzinom: Besser intern als extern bestrahlen	<b>28</b>
Mehr Obst in der Jugend – weniger Brustkrebs im Alter	<b>29</b>
Mammakarzinom: Gute Langzeitergebnisse nach Teilbrustbestrahlung	<b>30</b>
Metastasiertes Mammakarzinom: Verminderte Toxizität durch Ummantelung	<b>30</b>

### **KONGRESS FÜR SENOLOGIE, WIEN 2016**

Bewegung – Metastasierungstyp – sexuelle Dysfunktion	<b>27</b>
--	-----------

### **CHIRURGIE**

Appendizitis nach Gyn-OP: Komplikation oder Koinzidenz?	<b>31</b>
Fäkale Inkontinenz: Gute Ergebnisse mit TOPAS-System	<b>31</b>
Verschiedene Uterus-Nahttechniken bei Sectio im Vergleich	<b>31</b>
Postpartale Blutung stillen: Notfall-Naht	<b>32</b>
Benigne Hysterektomie: Blutungsprophylaxe mit Tranexamsäure	<b>32</b>
Hysteroskopische Adhäsiolyse: Rezidivrisiko je nach Typ und Lokalisation	<b>32</b>
Neue Daten zur akuten Appendizitis	<b>33</b>
Chirurgischer Schwangerschaftsabbruch: Mit oder ohne Zervix-Priming?	<b>33</b>

<b>FORSCHUNG &amp; ENTWICKLUNG</b>	<b>16</b>
<b>IM FOKUS</b>	<b>10</b>
<b>STENO</b>	<b>30</b>
<b>MED-INFO</b>	<b>34</b>
<b>IMPRESSUM</b>	<b>33</b>
<b>► CME Zertifizierte Fortbildung: Fragebogen</b>	<b>35</b>