



# neuro aktuell



**MED** geprüft Facharzt-Studie 2016 **Informationsdienst für Neurologen und Psychiater**

**Inhalt**

<b>Editorial</b>		<b>Gutachten</b>	
Islamistisch radikalisierte Jugendliche und heranwachsende Amoktäter – Warnsignale sehen und verstehen	3	Objektivität des Gutachters – Illusion und Notwendigkeit	16
<b>Neuro Forschung</b>		<b>Neurologie</b>	
Viele MS-Falschdiagnosen vor allem durch MRT-Fehlinterpretation	8	Therapie der zerebralen Vaskulitis – ein Update	23
Neue Behandlungsoption bei Neuropathien in Sicht?	9	<b>Depression</b>	
Depressionsbehandlung mit Opioiden	10	Depressionen bei somatischen Erkrankungen	27
<b>Kommentare</b>		<b>Sucht</b>	
Patientenverfügungsgesetz schafft Rechtssicherheit	10	Die S3-Leitlinien zu Alkohol- und Tabak-bezogenen Störungen	30
Adipositas gewinnt bei Krankheit und im Alter eine andere Bedeutung als bisher	12	<b>Kurz berichtet</b>	
Brexit – im britischen Gesundheitswesen nur ein aufgeregter Verwaltungsakt?	12	Wirksamkeit der Online-Psychotherapie: Therapeutenkontakt bleibt essenziell	34
<b>Neuro-Recht</b>		Gerade im Arzthaushalt wichtig, aber nicht unproblematisch: Minijobs	34
Heilbehandlungskosten	13	Morbus Menière: Diagnose in der Praxis einfacher mit neuen Kriterien	35
<b>Zika-Virus</b>		<b>Preis / Ausschreibung / News</b>	37
Sensorische Neuropathie als weitere neurologische Erkrankung identifiziert	15	<b>Zur Erinnerung</b>	
WHO verschärft Warnhinweise bei Zika: Mindestens sechs Monate lang „Safer Sex“	16	Zum 475. Todestag von Paracelsus: „Sei freundlich zu deinem Leibe, auf dass deine Seele gerne in ihm wohne“	44
		<b>Zuletzt</b>	
		Gehirn räumt im Schlaf auf – und bleibt dadurch lernfähig	46
		<b>Impressum</b>	47

Gemeinsames Auftreten von Migräne und Schwindel

## Vestibuläre Migräne

Dagny Holle-Lee, Hsin-Chieh Chen und Steffen Nägel, Essen

Die vestibuläre Migräne ist eine häufige und bislang oft unterdiagnostizierte Erkrankung. Ihre Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung wird auf ca. 1% geschätzt und sie stellt damit eine der häufigsten Schwindelerkrankungen überhaupt dar. Das gemeinsame Auftreten von Migräne und Schwindel ist seit langem bekannt und wurde bereits von dem griechischen Arzt Aretaeus von Kappadokien im Jahre 131 v. Chr. berichtet<sup>1</sup>. Die vestibuläre Migräne als eigene klinische Entität wurde aber erst 1999 von Dieterich und Brand definiert<sup>2</sup>. Erstmals 2001 wurden durch Neuhauser Diagnosekriterien für diese Erkrankung vorgelegt<sup>3</sup>. In der Folge entwickelten die Internationale Kopfschmerzgesellschaft (IHS) und die Bárány-Gesellschaft (Internationale neurootologische Gesellschaft) ein gemeinsames Konsensus-Papier zur Diagnose der vestibulären Migräne, die in die aktuellen IHS-Diagnosekriterien (ICHD-III beta) integriert wurden<sup>4</sup>. Die Erarbeitung dieser gemeinsamen Diagnosekriterien durch beide Fachgesellschaften hat erheblich zur Diagnosestellung und Bekanntheit der Erkrankung beigetragen.

Fortsetzung auf Seite 5

## Verlängern Sie die Stabilität bei Parkinson – mit XADAGO<sup>1-3</sup>

XADAGO<sup>®</sup> mit dem einzigartigen dualen Wirkmechanismus

**Therapie der zerebralen Vaskulitis**  
Seite 23 bis 27