



URO-ONKOLOGIE

- 178-190** Chronobiologie und Prostatakrebs
 Chronodisruption, Melatoninaktivität, zirkadiane Suszeptibilitätsgene, Chronotherapie
- Prostatakrebs (PCa)
 Melatoninsulfat/Kortison-Verhältnis im Urin
 Hinweis auf chronobiologische Assoziation?
- Neu diagnostizierter metastasierter Prostatakrebs
 Überleben bei Androgendeprivationstherapie mit und ohne zusätzliche Strahlentherapie
- Hoch-/Intermediärrisiko-Prostatakrebs
 Langzeitüberleben bei endokriner Therapie alleine und kombiniert mit Strahlentherapie
- Metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs
 PSA-Abfall nach vierwöchiger Abirateronacetat-Behandlung mit Gesamtüberleben assoziiert
- Oligometastasen des Prostatakarzinoms
 Progressionsfreies Überleben therapienaiver Patienten nach stereotaktischer Strahlentherapie
- Active Surveillance bei Prostatakrebs
 Langzeitergebnisse der bevölkerungsbasierten Göteborger PCa-Screening-Studie
- Prostatakrebs
 Häufigkeit der Ejakulationen im Erwachsenenalter beeinflusst Erkrankungsrisiko
- Klarzelliges Nierenzellkarzinom (ccRCC)
 Adjuvante Sunitinib-Therapie bei Patienten mit lokoregionärer Hochrisiko-Krankheit
- Nicht metastasiertes Nierenzellkarzinom
 Adjuvantes Sunitinib oder Sorafenib bei Patienten mit Hochrisiko-Krankheit
- Metastasiertes Nierenzellkarzinom
 Prognose für Patienten mit Absiedelungen in der Bauchspeicheldrüse
- Metastasiertes nicht klarzelliges Nierenzellkarzinom
 Everolimus versus Sunitinib — Erstlinie mit mTOR-Inhibitor oder VEGF-Rezeptor-Inhibitor
- Erstlinie bei fortgeschrittenem Urothelkarzinom
 Vinflunin–Gemcitabin vs. Vinflunin–Carboplatin bei nicht für Cisplatin geeigneten Patienten



URO-ONKOLOGIE

- 190-191** Muskelinvasives Urothelkarzinom der Harnblase
Thromboembolische Ereignisse bei Patienten mit neoadjuvanter Chemotherapie
Prognostische Faktoren bei Patienten mit „poor risk“ Keimzelltumor
Peniskrebs
Weltweite Prävalenz humaner Papillomaviren

UROLOGIE

- 192-199** Kindliche Harninkontinenz
Verkehrssicherheit unter anticholinergem Therapie – ein urologisches Thema?
Duloxetine bei Inkontinenz – pro oder contra?
Zusammenhänge zwischen Ängstlichkeit und überaktiver Blase oder Inkontinenzsymptomen
Diabetische Zystopathie: Wenn die Harnblase unter Zucker leidet

ANDROLOGIE

- 200-201** Verbindung zwischen endogenem Testosteron und ischämischen zerebrovaskulären Ereignissen
Melatonin- und Kortisonprofile in Verbindung mit altersbedingtem Kognitionsverlust

Mit Recht an Ihrer Seite

- 202-203** „Hyperlinks“ auf der eigenen Homepage: Welche rechtlichen Risiken gibt es?

Pharmaforum / Meldungen

- 204-207** Chemotherapie für einen optimalen Therapieerfolg bei mCRPC
Männergesundheit: Testosterondefizit als Risikomarker akzeptiert
Fortgeschrittenes Blasenkarzinom: Vorläufige Ergebnisse der Phase-I/II-Studie CheckMate-032
10 Jahre Nexavar - eine bewährte Substanz in der Therapie des mRCC
TERRAIN-Studie: Auch Weichteilmastasen sprechen auf Enzalutamid an
Bewegung und Sport bei Nierenkrebs: Neue Broschüre von Novartis

Impressum 207