



Epidemiologisches Bulletin

1. Februar 2016 / Nr. 4

AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN ZU INFektionsKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH

Stellungnahme der STIKO

Zur Anwendung von Tdap- bzw. Tdap-IPV-Impfstoffen für die Erstimmunisierung von Personen ab dem Alter von 4 Jahren

DOI 10.17886/EPIBULL-2016-007

Seit 2012 enthalten die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) Hinweise zu Nachholimpfungen von Personen mit unvollständigem oder unbekanntem Impfstatus. Die STIKO empfiehlt, zur Impfung gegen Diphtherie und Pertussis ab dem Alter von 5–6 Jahren Impfstoffe mit reduziertem Antigengehalt (d statt D und ap statt aP) zu verwenden. Dies gilt sowohl für Auffrischimpfungen als auch für die erstmalige Impfung Ungeimpfter bzw. von Personen mit unbekanntem Impfstatus. Die STIKO empfiehlt bei Personen mit unbekanntem Impfstatus (z. B. wegen fehlender Impfdokumente) im Interesse eines guten individuellen Impfschutzes von fehlenden Impfungen auszugehen und unabhängig vom Alter eine Erstimmunisierung zu beginnen.

Die in Deutschland zugelassenen Kombinationsimpfstoffe gegen Tetanus, Diphtherie und Pertussis (**Tdap**: Boostrix[®], Covaxis[®] [voraussichtlich bis 2017 nicht verfügbar], Tdap-IMMUN[®]) bzw. Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Poliomyelitis (**Tdap-IPV**: Boostrix-Polio[®], Repevax[®]) sind primär zur Auffrischimpfung vorgesehen. Unklar blieb bisher, ob die Anwendung dieser Impfstoffe bei bislang Ungeimpften von der Zulassung abgedeckt ist oder – wie in den aktuellen STIKO-Empfehlungen (*Epidemiologisches Bulletin* 34/2015, S. 357) ausgeführt – als über die Zulassung hinausgehend nur nach einer ausführlichen Aufklärung erfolgen kann.

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) stellt in seiner Funktion als nationale Zulassungsbehörde in Bezug auf den zulassungskonformen Gebrauch der jeweiligen Impfstoffe fest, dass bei Personen mit unbekanntem oder unvollständigem Impfstatus bezüglich Tetanus, Diphtherie, Pertussis und Poliomyelitis

1. der Impfstoff Tdap-IMMUN[®] (Tdap) zur Erstimmunisierung bei Personen ab dem Alter von 4 Jahren benutzt werden kann;
2. die Impfstoffe Covaxis[®] (Tdap) und Repevax[®] (Tdap-IPV) zur Erstimmunisierung ab dem jugendlichen Alter* benutzt werden können und
3. die Impfstoffe Boostrix[®] (Tdap) und Boostrix-Polio[®] (Tdap-IPV) zur Erstimmunisierung ab dem Alter von 40 Jahren benutzt werden können.

Für Auffrischimpfungen können alle genannten Impfstoffe für das in der jeweiligen Zulassung genannte Alter ohne Einschränkungen verwendet werden. Dies schließt die Vervollständigung einer früher begonnenen Impfserie ein.

In den Fachinformationen einiger der genannten Impfstoffe findet sich der Hinweis, dass diese zur Grundimmunisierung[†] nicht geeignet sind.

[†]nicht präzise definiert. Nach Auffassung der Vorsorgeuntersuchung von

Diese Woche 4/2016

Stellungnahme der STIKO

Hinweis auf Publikationen des Robert Koch-Instituts

Hinweis auf Veranstaltungen

Aktuelle Statistik meldepflichtiger Infektionskrankheiten
1. Woche 2016Zur Situation von Influenza-Erkrankungen für die
3. Kalenderwoche 2016