

**Redaktion**

Prof. Dr. Nicolas Rodondi, Bern (Chefredaktor); Dr. Nadja Pecinska, Basel (Managing editor); Prof. Dr. David Conen, Basel; Prof. Dr. Martin Krause, Münsterlingen; Prof. Dr. Klaus Neftel, Bern; Prof. Dr. Antoine de Torrenté, La Chaux-de-Fonds; Prof. Dr. Gérard Waeber, Lausanne; PD Dr. Maria Monika Wertli, Bern

**Beratende Redaktoren**

Prof. Dr. Reto Krapf, Luzern; Prof. Dr. Ludwig T. Heuss, Zollikerberg; Dr. Pierre Périat, Basel; Prof. Dr. Rolf A. Streuli, Langenthal

**Advisory Board**

Dr. Sebastian Carballo, Genève; Dr. Daniel Franzen, Zürich; Dr. Francine Glassey Perrenoud, La Chaux-de-Fonds; Dr. Markus Gnädinger, Steinach; Dr. Matteo Monti, Lausanne; Dr. Sven Streit, Bern; PD Dr. Ryan Tandjung, Zürich

**Und anderswo ...?**

A. de Torrenté

183 **Osteoporose nach der Menopause: welche Behandlungen und in welcher Reihenfolge?**

**Übersichtsartikel**

184 S. Bucher, S. Aebi, A. Günthert, K. Schwedler  
**Prävention des Mammakarzinoms bei Frauen mit hohem Risiko**  
 Frauen mit Genmutationen und Überlebende nach Tumoren mit therapeutischer Radiatio der Brustwand haben ein stark erhöhtes Brustkrebsrisiko. Familiäre Prädisposition, insbesondere der Nachweis gewisser Genmutationen, kann das Erkrankungsrisiko bis zu 80% erhöhen. Die prophylaktische bilaterale Mastektomie ist die effektivste Methode, das Brustkrebsrisiko erheblich zu reduzieren.

190 P. Frei, B. Straumann-Funk  
**Mikroskopische Kolitis**  
 Die mikroskopische Kolitis ist eine chronische Dickdarmentzündung mit wässrigen, nicht-blutigen Durchfällen trotz makroskopisch normaler oder fast normaler Kolonmukosa.

**Was ist Ihre Diagnose?**

P. Mehier, S. Chappuis, P.-A. Bart, T. Zaugg

194 **Rezidivierende Uveitis bei einer 43-jährigen Patientin**

Eine 43-jährige, aus Sri Lanka stammende Patientin leidet seit 2007 unter rezidivierenden, nicht granulomatösen vorderen Uveitiden beidseits. Zwei bis drei Monate vor der aktuellen Hospitalisation verspürt sie linkshemisphärische, brennende Kopfschmerzen ohne Beeinträchtigung des Visus, aber mit Ausstrahlung in die linke Ohrmuschel sowie eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit der ganzen Kopfhaut.



> FÜR EINEN GUTEN START IHRER PATIENTEN IN DIE BASALINSULINTHERAPIE.

Abasaglar\* ist indiziert für die Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.†

Referenzen: Fachinformation Abasaglar\*, 5. Aufl. Okt. 2014; www.wissenschaft.ch; die «Zürcher Fachzeitschrift»



## Fallberichte

- 198 E. Hurni-Zihlmann, R. O. von Vigier, S. Noti-Götschmann  
**Kleinkind mit Epstein-Barr-Virus-Infektion**  
 Die eindrücklichen schweren Allgemeinsymptome bei einer EBV-Infektion beim Kleinkind können zu einer nicht ganz evidenzkonformen Diagnostik und Therapie verleiten.
- 200 M. Steib, J. Schardt, G. Marti  
**Das anorektale Melanom**  
 Wegen der Seltenheit des anorektalen Melanoms liegt eine zu geringe Datenlage für einheitliche Behandlungskonzepte vor. Es erfordert deshalb eine fallbezogene, multidisziplinär geplante Herangehensweise. Therapiegrundlage ist die vollständige chirurgische Resektion, wobei weniger invasive Methoden gegenüber der perinealen Resektion nicht sicher unterlegen sind.
- 203 F. Christou, F. Simonetta, P. Martinez, C. Chuard, T. Nierle  
**Bartonellose systémique avec atteinte splénique**  
 La maladie des griffes du chat est une entité clinique bien connue et habituellement bénigne. Néanmoins, l'extension systémique de l'infection est possible chez les patients immunosupprimés et peut initialement échapper au diagnostic au vu de sa présentation clinique peu spécifique.

## Extended abstracts from SMW

New articles from the online journal "Swiss Medical Weekly" are presented after page 206.

## Gekürzte Fachinformation Abasaglar\* zum Inserat auf der Rückseite

**Abasaglar\* Zusammensetzung:** Insulinum Garginum 100 Einheiten/ml. Insulin Gargin ist ein Insulin-Analogon, das mittels gentechnologischer Methoden unter Verwendung von *Escherichia coli* gewonnen wird. **Indikation:** Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren, sofern die Behandlung mit Insulin erforderlich ist. **Dosierung:** Abasaglar\* hat eine verlängerte Wirkdauer und wird subkutan einmal täglich zu einer beliebigen Zeit, jedoch jeden Tag zur gleichen Zeit (bei Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren am Abend) verabreicht. Die Dosierung muss individuell festgelegt werden. **Kontraindikationen:** Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. **Warnhinweise/Vorsichtsmassnahmen:** Abasaglar\* ist nicht das Insulin der Wahl für die Behandlung der diabetischen Ketoazidose. Nicht mit anderen Insulinen mischen oder verdünnen. Umstellung auf ein anderes Insulinpräparat oder Änderungen des Behandlungsschemas nur unter ärztlicher Kontrolle. **Interaktionen:** Andere Arzneimittel oder Alkoholenuss können die Insulinwirkung verstärken oder abschwächen sowie die Warnzeichen einer Hypoglykämie verschleiern. **Schwangerschaft/Stillzeit:** Abasaglar\* kann erforderlichenfalls während der Schwangerschaft verordnet werden. Es liegen bislang keine Daten aus kontrollierten klinischen Studien vor, aus Fallstudien und Tierstudien lassen sich keine Hinweise auf eine schädliche Wirkung ableiten. Es ist nicht bekannt, ob Insulin Gargin in die Muttermilch übergeht. **Unerwünschte Wirkungen:** Sehr häufig: Hypoglykämie. Häufig: Lipohypertrophie, Reaktionen an der Einstichstelle (relative Häufigkeit bei unter 18-Jährigen höher). Gelegentlich: Lipoatrophie. Selten: allergische Reaktionen, Sehstörungen, Retinopathie, Ödeme. Sehr selten: Geschmacksstörung, Myalgie. **Langzeitdaten:** Die ORIGIN Studie, die über mehr als 6 Jahre geführt wurde, bestätigt die Wirksamkeit und kardiovaskuläre Sicherheit bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko. **Packungen:** 5 Patronen zu 3 ml; 5 Fertigspritzen Kwipen zu 3 ml. **Abgabekategorie:** B. Kassenzulässig. **Stand der Information:** Oktober 2014. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation unter [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch). Eli Lilly (Suisse) SA, 1214 Vernier/GE. ABA-016-004

## Impressum

**Swiss Medical Forum –  
 Schweizerisches Medizin-Forum**  
 Offizielles Fortbildungsorgan der FMH  
 und der Schweizerischen Gesellschaft  
 für Innere Medizin

**Redaktionsadresse:** Ruth Schindler,  
 Redaktionsassistentin SMF,  
 EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG,  
 Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,  
 Tel. +41 (0)61 467 85 58,  
 Fax +41 (0)61 467 85 56,  
 office@medicalforum.ch,  
[www.medicalforum.ch](http://www.medicalforum.ch)

Manuskripteinreichung online:  
<http://www.edmgr.com/smf>

**Verlag:** EMH Schweizerischer Ärzte-  
 verlag AG, Farnsburgerstrasse 8,  
 4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,  
 Fax +41 (0)61 467 85 56, [www.emh.ch](http://www.emh.ch)

**Marketing EMH / Inserate:**  
 Dr. phil. II Karin Würz, Leiterin  
 Marketing und Kommunikation,  
 Tel. +41 (0)61 467 85 49, Fax +41  
 (0)61 467 85 56, [kwuerz@emh.ch](mailto:kwuerz@emh.ch)

**Abonnemente FMH-Mitglieder:**  
 FMH Verbindung der Schweizer  
 Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,  
 3000 Bern 15, Tel. +41 (0)31 359 11 11,  
 Fax +41 (0)31 359 11 12, [dlim@fmh.ch](mailto:dlim@fmh.ch)  
**Andere Abonnemente:** EMH Schweize-  
 rischer Ärzteverlag AG, Abonnemente,  
 Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,  
 Tel. +41 (0)61 467 85 75,  
 Fax +41 (0)61 467 85 76, [abo@emh.ch](mailto:abo@emh.ch)  
**Abonnementspreise:** zusammen  
 mit der Schweizerischen Ärzte-  
 zeitung 1 Jahr CHF 395.– / Studenten  
 CHF 198.– zzgl. Porto; ohne Schweize-  
 rische Ärztezeitung 1 Jahr CHF 175.– /  
 Studenten CHF 88.– zzgl. Porto  
 (kürzere Abonnementsdauern: siehe  
[www.medicalforum.ch](http://www.medicalforum.ch))

ISSN: Printversion: 1424-3784 /  
 elektronische Ausgabe: 1424-4020  
 Erscheint jeden Mittwoch

© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG  
 (EMH), 2016. Das Swiss Medical Forum  
 ist eine Open-Access-Publikation  
 von EMH. Entsprechend gewährt EMH  
 allen Nutzern auf der Basis der Creative-  
 Commons-Lizenz «Namensnennung –  
 Nicht kommerziell – Keine Bearbei-  
 tungen 4.0 International» das zeitlich  
 unbeschränkte Recht, das Werk zu ver-  
 vielfältigen, zu verbreiten und öffentlich  
 zugänglich zu machen unter den Bedin-  
 gungen, dass (1) der Name des Autors  
 genannt wird, (2) das Werk nicht für  
 kommerzielle Zwecke verwendet wird  
 und (3) das Werk in keiner Weise bear-  
 beitet oder in anderer Weise verändert  
 wird. Die kommerzielle Nutzung ist nur  
 mit ausdrücklicher vorgängiger Erlaub-  
 nis von EMH und auf der Basis einer  
 schriftlichen Vereinbarung zulässig.

**Hinweis:** Alle in dieser Zeitschrift  
 publizierten Angaben wurden mit der  
 grössten Sorgfalt überprüft. Die mit  
 Verfassernamen gezeichneten Ver-  
 öffentlichungen geben in erster Linie  
 die Auffassung der Autoren und nicht  
 zwangsläufig die Meinung der SMF-  
 Redaktion wieder. Die angegebenen  
 Dosierungen, Indikationen und Appli-  
 kationsformen, vor allem von Neuzu-  
 lassungen, sollten in jedem Fall mit  
 den Fachinformationen der verwen-  
 deten Medikamente verglichen werden.

Herstellung: Schwabe AG, Muttenz,  
[www.schwabe.ch](http://www.schwabe.ch)

printed in  
 switzerland

Titelbild:  
 © Cornelius20 | Dreamstime.com