


Trocken bleiben!



Naltrexin®

(Naltrexon HCl)

Seit 20 Jahren erfolgreich!

Inhaltsverzeichnis

- 4 **Riskantes Sterben – das Lebensende in der reflexiven Moderne**
Werner Schneider
- 10 **Die mediale Inszenierung des berauschten Todes**
Sandro Cattacin, Fiorenza Gamba
- 15 **Chancengleiche Palliative Care im Migrationskontext?**
Corina Salis Gross
- 21 **Vom Tabu zum Muss? Das Thema «Lebensende» in der Psychiatrie**
Stella Reiter-Theil
- 25 **Zusammenarbeit für ein gutes Sterben in der Substitutionsbehandlung**
Gespräch mit Kaspar Zölch und Peer-Willem Brandt
- 31 **Seelsorge und Trauerarbeit auf der Gasse**
Franz Zemp
- 34 **Psychotherapie am Lebensende mit psychoaktiven Substanzen**
Peter Gasser
- 38 **Sterben im Justizvollzug – Suchtmittelabhängigkeit und Todesfälle**
Ueli Hostettler, Irene Marti, Marina Richter
- 20, 30 Bücher zum Thema
- 43 Fotoserie
Sabine Rock
- 44 **Fazit. Forschungsspiegel von Sucht Schweiz**
- 37, 42 Neue Bücher
- 46 Veranstaltungen
- 47 Newsflash

Naltrexin Filmtabletten

Z: Naltrexon HCl: 50 mg. **I:** Medikamentöse Unterstützung der Entwöhnungsbehandlung nach erfolgter Entgiftung von Opiatabhängigen oder Alkoholabhängigen. **D:** 50 mg/Tag. Vor Beginn der Behandlung muss sichergestellt sein, dass der Patient opiatfrei ist. → Weitere Informationen siehe vollständige Fachinformation. **K:** Opioid-abhängige Patienten ohne erfolgreichen Entzug, Patienten mit akuten Opiat-Entzugssymptomen, positiver Opioid-Nachweis im Urin, Patienten, die Opioid-Analgetika erhalten, schwere Leberinsuffizienz, akute Hepatitis, Überempfindlichkeit gegen Wirkstoff oder Hilfsstoffe, **V:** Leberinsuffizienz, schwere Lebererkrankung in der Anamnese, Lebensgefahr bei Verabreichung hoher Dosen von Opiaten. **IA:** Opioid-Nachweis im Urin. **IB:** Keine Anwendung in der Schwangerschaft.