

► **Schwerpunkte: Frauengesundheit & Urogynäkologie**

Überleben mit invasivem epitheliales Ovarialkarzinom
Gesunde Kost vermutlich von Vorteil Seite 3

Zweiwöchige Intervention zu Sport und Ernährung
Patientinnen profitieren auf lange Sicht Seite 3

Vergleich der Stärke des Beckenbodens
Nullipara haben die kräftigsten Muskeln Seite 3

Fortgeschrittener uterovaginaler Prolaps
Kuldoplastik nach McCall so effektiv wie bei weniger schweren Stadien .. Seite 6

Gebärmuttererhalt versus Hysterektomie beim Uterusprolaps
Review mit Meta-Analyse zeigt pro und contra auf Seite 6

TOT- und TVT-Verfahren bei Belastungsinkontinenz
Verschiedene Techniken offenbar langfristig ähnlich sicher und effektiv .. Seite 7

De novo überaktive Blase nach mittlerehralen Schlingenverfahren
Kein signifikanter Unterschied zwischen den Schlingentypen Seite 7

Einfluss des Stillens auf die maternale Knochengesundheit untersucht
Bei mindestens einmonatiger Dauer weniger Hüftfrakturen Seite 9

Endometriumkarzinom
Stillen senkt das Risiko Seite 9

Multivitaminpräparate in Ländern mit hohem Einkommen
Eventuell zur Reduktion nachteiliger Schwangerschaftsergebnisse ratsam Seite 9

Kombinierte orale Kontrazeptiva und Krebs
Neutrale Gesamtbilanz Seite 10

Überleben nach Brustkrebs
Gestörter und zu viel Schlaf erhöhen die Mortalität Seite 10

► **Brustkrebs & Gynäkologische Krebserkrankungen**

TH3RESA-Studie zu Trastuzumab-Emtansin versus Therapie nach Wahl des Arztes
Signifikant längeres Gesamtüberleben Seite 4

Finale Überlebensdaten der EMILIA-Studie
Trastuzumab-Emtansin verlängert das Überleben Seite 4

Mammographie-Screening
Alle Nutzen/Risiko-Verhältnisse sollten mit Vorsicht betrachtet werden ... Seite 5

Residueller HER2-negativer Brustkrebs nach neoadjuvanter Chemotherapie
Längeres Überleben nach adjuvanter Capecitabin-Therapie Seite 6

Adjuvantes Pertuzumab und Trastuzumab beim frühen HER2-positiven Brustkrebs
Rezidivrisiko reduziert Seite 8

► **Reproduktionsmedizin, Schwangerschaft & Geburtshilfe**

Fortgeschrittenes Alter bei Zwillingschwangerschaften
Kein zusätzlicher Risikofaktor Seite 3

Krebs in der Schwangerschaft
Risiken für Totgeburten und neonatale Mortalität im Fokus Seite 4

Lithium im ersten Trimenon
Risiko für kardiale Fehlbildungen erhöht Seite 5

Schutz des Analsphinkters bei vaginal-operativen Entbindungen
Mediolaterale Episiotomie senkt das Verletzungsrisiko deutlich Seite 5

Schwangerschaft nach Brustkrebs
Ab sechs Monaten nach der Diagnose am günstigsten Seite 7

Kryoembryonen-Einzeltransfer
Letrozol verbessert die Ergebnisse Seite 10

► **Diverses**

Postoperative Erhaltungstherapie mit LNG-IUS
Kein Schutz vor erneuten Endometriomen Seite 8

Dysmenorrhoe und Beckenschmerz bei Endometriose
Elagolix zeigt Wirkung Seite 8

► **Industrie** Seite 11