

► Schwerpunkt: Endometriose

Dienogest bei Endometriose
Postoperativ sicher und wirksam Seite 3
Adenomyose
Intermittierende Langzeitbehandlung mit Danazol effektiv Seite 4
Tiefe Endometriose
Darmläsionen weisen erhöhte mRNA-Expression von LDL-Rezeptoren auf Seite 4
Tief infiltrierende Endometriose
Spiegel der zirkulierenden Mikropartikel erhöht Seite 4
Unfruchtbarkeit bei Endometriose
Frühere Operation und Endometriome als negative Prädiktoren Seite 6
World Endometriosis Society
Konsens zur Klassifikation der Endometriose erstellt Seite 7

► Brustkrebs & Gynäkologische Krebserkrankungen

Moderate bis intensive körperliche Freizeitaktivität
Effekt auf prä- und postmenopausales Brustkrebsrisiko ähnlich Seite 6
Urogenitales Menopausen-Syndrom nach Brustkrebs
Behandlung mit dem Erbiumlaser wirkt für etwa ein Jahr Seite 7
Sportlicher Lebensstil reduziert Brustkrebsrisiko
Bei der Stange bleiben ist wichtig Seite 8
Platinresistentes Ovarialkarzinom: Tamoxifen versus Chemotherapie
Sinnvolle Therapiealternative Seite 8
Nach primärer Debulking-Operation beim Ovarialkarzinom:
Start der Chemotherapie zwischen Tag 21 und 35 sinnvoll Seite 9
Fulvestrant versus Anastrozol bei Hormonrezeptor-positivem Brustkrebs
Progressionsfreies Überleben verlängert Seite 9
Rucaparib beim rezidivierten, platinsensitiven hochgradigen Ovarialkarzinom
Längeres Überleben ohne Progression nicht nur mit BRCA-Mutation Seite 10

► Diverses

Dauer der Prämenopause
Bei frühem Beginn deutlich länger Seite 3
Prävention des paralytischen Ileus
Kaffee bringt den Darm in Schwung Seite 3
Aufbau von Magermasse in der Postmenopause
Ganzkörpervibration reicht leider nicht Seite 3
Linderung vasomotorischer Symptome durch Hormontherapien
Transdermal und oral in niedriger Dosierung ähnlich effektiv Seite 6
Inhouse-Komplikationen bei Hysterektomie wegen benigner Erkrankung
Kein höheres Risiko durch bilaterale Salpingo-Oophorektomie Seite 7
Hysterektomie aufgrund benigner Erkrankung in der Prämenopause
Nutzen des Ovarerhalts überwiegt Seite 8
Subklinische Hypothyreose oder Hypothyroxinämie in der Schwangerschaft
Levothyroxin ohne Effekt auf IQ-Wert des Nachwuchses Seite 9
Bilaterale Salpingektomie bei Hysterektomie zur Prävention des Ovarialkarzinoms
Signifikanter Anstieg, postoperative Risiken nicht erhöht Seite 10
Erstlinientherapie bei Anovulation der WHO-Gruppe II
Letrozol offenbar eine gute Wahl Seite 10

► IndustrieSeite 11