

Optometrie

- 6** Anpassung von formstabilen, cornealen Kontaktlinsen nach Trabekulektomie
Rainer Bronner
- 15** Fallbericht:
Falconus – perfekt für Keratokonus
Ulrich Maxam
- 18** Der InflammDry-Test in der optometrischen Praxis
Carolin Truckenbrod
- 20** Retinale Narbenbildung, verursacht durch eine durch psychologischen Stress induzierte rezidive Uveitis
Ralf Bachmann

Interview

- 26** 10 Fragen an
Dr. rer. nat. Stephan Reiß
Wolfgang Cagnolati

Tagung

- 32** Interlens tagte an der HFAK
Ulrich Maxam

Zum Titelbild

Jedes Auge ist einzigartig. Deshalb werden unsere Contactlinsen nach Maß gefertigt.

Persönlicher geht es nicht!

Hecht Contactlinsen GmbH

Dorfstr. 2-4

79280 Au bei Freiburg

Tel. 0049 761 40105.0


www.hecht-contactlinsen.de

info@hecht-contactlinsen.de




„Das Europäische Diplom für Optometrie ist ein notwendiger und folgerichtiger Schritt in einer Welt der Globalisierung.“

10 Fragen an Dr. rer. nat. Stephan Reiß, einer von drei neuen akademischen Mitarbeitern im Studiengang Augenoptik/Optometrie an der Beuth Hochschule für Technik Berlin. **Seite 26**



◀ Trabekulektomie | Bei zu hohem Augeninnendruck ist eventuell das Anlegen eines Sickerkissens eine Therapie, wenn mit topischen Tropfen kein Erfolg erzielt wird. Das macht die Versorgung des betroffenen Auges mit Kontaktlinsen schwierig. Rainer Bronner beschreibt, wie er in einem derartigen Fall vorgegangen ist. **Seite 6**

Retinale Narbenbildung | ► Einen Zufallsbefund und dessen Erklärung beschreibt Ralf Bachmann. **Seite 20**



Rubriken

- 3 Editorial
- 28 VDCO-Mitteilungen
- 30 Netznews