

► **Schwerpunkt: Brustkrebs Et Gynäkologische Krebserkrankungen**

Abnehmen in der Postmenopause
 Geringeres Endometriumkarzinom-Risiko Seite 2
Randomisierte kontrollierte Studien
 ESMO-Kriterien für Nutzen oft verfehlt Seite 2
Aromataseinhibitoren versus Tamoxifen
 AI nur scheinbar kardiotoxisch Seite 2
Mädchen oder Frauen nach Keimzelltumoren
 Maligne Neubildungen nicht häufiger Seite 2
Hormonrezeptor- und nodal-positiver früher Brustkrebs in der Postmenopause
 Letrozol nicht wirksamer als Anastrozol Seite 3
Finale Analyse der HERA-Studie
 Einjährige Trastuzumab-Therapie bei HER2-positivem Brustkrebs sinnvoll...Seite 3
Finale Analyse der BEATRICE-Studie zum triple-negativen Mammakarzinom
 Zusatz von Bevacizumab zu Chemotherapie offenbar ohne Nutzen Seite 3
Vaginalatrophie, Dyspareunie und Libidoverlust unter Aromataseinhibitoren
 Estradiolring und Testosteron-Creme wirksam und offenbar sicher Seite 4
FIRES-Studie zum Staging beim Endometriumkarzinom
 SLN-Mapping Alternative zu vollständiger Lymphadenektomie Seite 4
Subanalyse der GeparSepto-Studie
 Duale HER2-Blockade plus Chemotherapie führt zu hoher pCR-Rate Seite 4
HER2-überexprimierende Tumore
 Margetuximab erstmals an Menschen getestet – mit Erfolg Seite 5
Serös-papilläre Low-grade-Karzinome von Ovar oder Peritoneum
 Endokrine Erhaltungstherapie verlängert progressionsfreies Überleben Seite 5
Empfänglichkeit für Trastuzumab-assoziierte kardiale Toxizität
 Troponine I und T prognostisch relevant Seite 5
Neoadjuvante Chemotherapie beim Mammakarzinom
 Residuelle Krebslast für das Langzeitüberleben prognostisch relevant Seite 6
Endokrine Therapie beim Hormonrezeptor-positiven frühen Brustkrebs
 Cholesterinsenkung geht mit besseren Ergebnissen einher Seite 6
BCRC 005-Biomarker-Studie zu metastasiertem Brustkrebs
 Methylierung bestimmter Gene indikativ für Ansprechen und Prognose .. Seite 6
Endometriumkarzinom: Bewegungsmangel erhöht Risiko
 Gut jeder fünfte Fall vermeidbar Seite 7
Neoadjuvante Chemotherapie beim epithelialen Ovarialkarzinom
 Immuninfiltration und PD-L1-Expression erhöht Seite 8
Einfluss von Rauchen beim Ovarialkarzinom
 Krankheitsverlauf negativ beeinflusst Seite 8
Rauchen zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose
 Entwöhnung verlängert das Leben sehr wahrscheinlich Seite 8

► **Diverses**

Ruhepuls und Beginn des fertilen Fensters
 Sensorenarmband misst fruchtbare Tage Seite 7

► **Industrie** Seite 9