

# Case Report

8/2017

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 2 | Impressum   | 10 | <b>Fall 3: 49-jähriger VHF<sup>f</sup>-Patient mit Blutungskomplikation unter Triple-Therapie nach Myokardinfarkt und PCI</b>               |
| 3 | Editorial   | 12 | <b>Fall 4: 69-jähriger VHF<sup>f</sup>-Patient mit akutem Myokardinfarkt nach Polypektomie und nachfolgender gastrointestinaler Blutung</b> |
| 4 | <b>Schlaganfallprophylaxe bei VHF<sup>f</sup>: Apixaban mit sehr gutem Nutzen-Risiko-Profil in einem breiten Patientenkollektiv</b>                       | 14 | <b>Fazit: NOAKs als gut verträgliche und für den Patienten effektive Standardtherapie in der Schlaganfallprophylaxe bei VHF<sup>f</sup></b> |
| 6 | <b>Fall 1: 82-jähriger multimorbider VHF<sup>f</sup>-Patient mit subakutem embolischen Schlaganfall bei vorbestehender chronischer Niereninsuffizienz</b> | 15 | Literatur   |
| 8 | <b>Fall 2: 59-jährige VHF<sup>f</sup>-Patientin mit akutem Medialeinfarkt unter VKA-Therapie</b>  |    |   |