

Case Report

16/2018

- | | |
|---|--|
| <p>2 Impressum</p> <p>3 Editorial: Prophylaxe – die Standardtherapie für jedes Lebensalter</p> <p>4 Kovaltry® – Gute Wirksamkeit in jedem Lebensalter</p> | <p>6 Fall 1/2: Früher Prophylaxebeginn zur Vermeidung von FVIII-Inhibitoren</p> <p>10 Fall 3: Junger Erwachsener mit Hämophilie A und ADHS</p> <p>11 Fall 4: Reduzierte Blutungsrate nach Umstellung auf Prophylaxe bei 48-jährigem Patienten</p> |
|---|--|



Dr. med. Rosa Sonja Alesci, Bad Homburg



Dr. Günter Auerswald, Bremen



Dr. med. Christine Schubert, Erfurt

Prophylaxe – die Standardtherapie für jedes Lebensalter

Der Nutzen der Blutungsprophylaxe ist seit mehr als 40 Jahren in verschiedenen Untersuchungen durch Reduzierung von Gelenkblutungen und Arthropathien gezeigt worden. Dabei haben sich rekombinante Faktor-VIII-(rFVIII) Produkte als gleichzeitig sicher und effektiv erwiesen. Dank der prophylaktischen FVIII-Substitution hat sich die Lebenserwartung von Patienten mit Hämophilie A inzwischen nahezu normalisiert.

Allerdings können bei rund 30% der Hämophilie-Patienten Inhibitoren gegen den substituierten FVIII auftreten, meist zu Beginn der Therapie. Dies kann dann mit schwerwiegenden Folgen verbunden sein, wie vermehrte Blutungen, Folgeschäden und eingeschränkte Lebensqualität. Da die meisten Risikofaktoren, z. B. die Art der FVIII-Mutation oder die Familienanamnese, nicht beeinflussbar sind, bleibt es oberstes Ziel, Therapiestrategien mit möglichst geringem Inhibitorrisiko zu identifizieren.

Studien zeigten [1, 2], dass ein früher Prophylaxebeginn mit initial niedrig dosierter 1-mal wöchentlicher FVIII-Gabe vor einer Inhibitorentwicklung schützen könnte. Zwei der in diesem Case Report vorgestellten Fallbeispiele sprechen für den Erfolg dieser Strategie bei sehr jungen, bisher nicht behandelten Patienten. In der täglichen Praxis bewährt sich die Prophylaxe auch bei älteren, erwachsenen Patienten.

In 2 weiteren Kasuistiken wird die erfolgreiche Umstellung der Therapie eines jugendlichen und eines erwachsenen Patienten auf die Prophylaxe mit dem unmodifizierten rFVIII Kovaltry® vorgestellt.

Wir wünschen Ihnen eine informative und für die eigene Praxis anregende Lektüre.

Literatur

- [1] Kurnik K et al. Haemophilia 2010; 16: 256–262
- [2] Auerswald G et al. Haemophilia 2012; 18: e1–e41