

## URO-ONKOLOGIE

- 72-79 Survivin als Prognosemarker und therapeutisches Ziel bei urologischen Krebserkrankungen
- Apoptose-Inhibitor-Proteine und Krebs
  - Survivin und Prostatakrebs
  - Survivin und Urothelkarzinom
  - Survivin-Inhibition beim Nierenzellkarzinom

### **Hochrisiko-Nierenzellkarzinom**

Tumorbettrezidive nach partieller Nephrektomie kleiner Nierentumoren

Adjuvantes Sunitinib nach Nephrektomie: Sekundäre Analysen der S-TRAC-Studie

### **Urothelkarzinom**

Lebensqualitätsanalyse bestätigt Verträglichkeit von Pembrolizumab  
ATM/RB1-Mutationen gehen mit verkürztem Überleben einher

## UROLOGIE

- 80-90 ICG-Fluoreszenzangiographie zur Durchblutungssicherung bei der roboterassistierten Blasenhaloplastik

Pathophysiologische Mechanismen der erektilen Dysfunktion nach radikaler Prostatektomie – Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Penisimplantat?

Operative Therapie der Stressinkontinenz mit einem artifiziellen Sphinkter

### **Kontroversen in der Prolaps-Chirurgie**

Sollte man weiterhin Netze zur Prolaps-Korrektur implantieren?  
Lassen sich Drangsymptome operativ beheben?

### **Interstitielle Cystitis / Blasenschmerzsyndrom**

Hydrodistension der Harnblase bei Patienten mit Blasenschmerzsyndrom

Eingeschränktes endogenes Schmerzkontrollsystem bei IC-Patienten

## ANDROLOGIE

92-94 Testosteronausgleich erhält Muskelkraft und Muskelpower bei alternden Männern mit Typ-2-Diabetes

Biochemische und klinische Entsprechungen eines Hypogonadismus bei Typ-2-Diabetikern

Bei dialysepflichtigen Männern ist niedriges Serum-Testosteron mit negativen klinischen Ergebnissen assoziiert

## Mit Recht an Ihrer Seite

96-97 **Rechtsfragen an Fachanwalt Dr. Stebner**

- Kommunikation mit Patienten über moderne Medien
- Sind Kurse in Beckenbodengymnastik Heilbehandlung?
- Neues Datenschutzrecht und Aufbewahrung meiner Patientenakten
- Darf ein Patient die Löschung seiner Daten verlangen?
- Fotos von Therapiegeräten mit kurzen Beschreibungen auf meiner Website

## Pharmaforum / Meldungen / Impressum

98-101 NEU: Tadalafil STADA® 5 mg – über 60 % Ersparnis

Antibiotikatherapie mit Pivmecillinam bei akuter unkomplizierter Zystitis

Ejaculatio praecox

Neue innovative Therapie mit Desensibilisierungs-Spray

SPARTAN-Studie

Apalutamid in der Behandlung des nmCRPC

Neuer Multikinase-Inhibitor beim mRCC: Wirksamkeit und Verträglichkeit sprechen für Tivozanib in der Erstlinientherapie

Impressum