

INHALT

DIE DRITTE SEITE

Längsschnittstudie mit Jugendlichen: ADHS-Symptome durch Social media & Co.?

Psychopharmaka in deutschen Allgemeinkrankenhäusern: Nicht indizierte Off-label-Gabe überaus häufig

PARKINSON-SYNDROME

► **CME:** Morbus Parkinson in Deutschland: Prävalenz, Inzidenz und Mortalität deutlich höher als gedacht?

Beobachtungsstudie bei Parkinson-Patienten: Polyneuropathie mehr als doppelt so häufig?

Antikörper-Therapie bei Parkinson-Patienten: α -Synuclein-Serumspiegel um 97% gesenkt

Safinamid als Add-on: Weniger Schmerzen, weniger Depression, mehr Lebensqualität

EPILEPSIE

► **CME:** EURAP-Registerdaten aus 42 Ländern: CAVE: Teratogenität unter Antiepileptika

Neue MRT-Sequenz bei fokaler kortikaler Dysplasie: FLAWS zur Identifizierung epileptogener Zonen

AFFEKTIVE STÖRUNGEN

Prävention und Behandlung perinataler Depression: Die Familientherapie hilft!

Aufarbeitung der Germanwings-Katastrophe 2015: Risikofaktoren für einen „Pilotensuizid“

► **CME:** Stressbelastung im Job: Machen lange Arbeitszeiten depressiv?

SCHIZOPHRENIE

Höhere Mortalität bei pathologischen Kaliumwerten: CAVE: Komedikation Antipsychotika + Diuretika

Psychose-Symptome nach Absetzen von Antipsychotika: Rezidiv – oder vielleicht Entzugserscheinung?

Wirken Antipsychotika antientzündlich? Proinflammatorische Zytokine verringert, antiinflammatorische erhöht 14

6 Ziel ist die Stabilisierung und Reintegration: Aripiprazol-Depot bessert Arbeitsfähigkeit, Funktionalität und Lebensqualität 14

6 MULTIPLE SKLEROSE

► **CME:** Progression der Multiplen Sklerose: Rückenmark-Atrophie stärker beachten? 15

7 Psychische Gesundheit bei MS-Patienten: Fast ein Drittel wünscht sich professionelle Hilfe 15

7 Sollte vielleicht supplementiert werden? Niedrige Biotin-Spiegel bei MS-Patienten 16

8 MS-Therapie mit Teriflunomid und Alemtuzumab: Individualisiert und Patienten-zentriert behandeln 16

8 THC/CBD-haltiges Oromukosalspray in der SAVANT-Studie: Als Add-on wirksam bei MS-bedingter Spastik 17

ADHS

10 ► **CME:** Remittierte versus persistierende und late-onset ADHS: Probleme und funktionelles Outcome bei jungen Erwachsenen 20

10 DEMENZIELLE SYNDROME

► **CME:** Pathologie der Alzheimer-Demenz: Spielen Herpesviren eine maßgebliche Rolle? 21

11 VARIA

11 Vergleich mit anderen Polyneuropathie-Patienten: Parameter für die frühere TTR-FAP-Diagnose 22

DAS BEDEUTEN DIE SYMBOLE AM ANFANG DER QUELLE

A Anwendungsbeobachtung

M Metaanalyse

G Fall-Kontroll-Studie

R Randomisiert-kontrollierte Studie

F Fallbericht

S Sonstige Studienarten

K Kohortenstudie

U Übersicht

INHALT

Jetzt bei hATTR zugelassen: Inotersen zur Behandlung der Polyneuropathie	22
--	----

VASKULÄRE ERKRANKUNGEN

Persistierende Beeinträchtigung nach Schlaganfall: Roboter-Training bessert die Arm/Hand-Funktion	23
Prämobider Bluthochdruck: Disposition für lakunäre Infarkte?	23

RESTLESS-LEGS-SYNDROM

► CME: RLS-Patienten stärker hochdruckgefährdet?	26
---	----

KOPFSCHMERZ

► CME: Migräne-Patienten: Häufigere Attacken bei Vit-D-Mangel?	27
Migräne- plus Depressionsschwere: Beide durch HF-rTMS signifikant verringert	28
Episodische und chronische Migräne: Attacken-Prophylaxe mit Fremanezumab	28
Migräne-Prophylaxe mit Erenumab: Auch bei therapierefraktärer episodischer Migräne wirksam	32

KONGRESS

60. Jahrestreffen der AHS, 28.06–1.07.2018, San Francisco	30
---	----

STENO	12
-------	----

APP-ANALYSE	17
-------------	----

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG	21
-------------------------	----

SITE-SEEING	26
-------------	----

IM FOKUS	27
----------	----

IMPRESSUM	32
-----------	----

MED-INFO	34
----------	----

► CME: Zertifizierte Fortbildung: der Fragebogen	35
---	----