

## INHALTSVERZEICHNIS

---

Experte	Frage	Thema	Seite
<b>Trautmann, M.</b>	9586	Muss zwischen chirurgischer Händewaschung und chirurgischer Händedesinfektion ein Abstand von mindestens 10 min. liegen?	6
<b>Schulz-Stübner, S.</b>	9592	Gibt es Hinweise auf steigende Alkoholresistenzen/ -toleranzen bei nosokomialen Erregern?	8
<b>Glück, T.</b>	9616	Welche Endokarditisprophylaxe wird bei Z. n. Mitralklappenrekonstruktion empfohlen?	11
<b>Hagel, S.</b>	9620	Welche Möglichkeiten der Antibiose gibt es bei der Behandlung einer Staphylokokken-Bakteriämie in der Pädiatrie?	13
<b>Geffers, C.</b>	9622	Ist bei nachgewiesener MRSA-Kolonisierung in einer Klinik ein Mitarbeiterscreening zulässig und sinnvoll?	15
<b>Lübbert, C.</b>	9625	Gelten für adipöse Patienten in der perioperativen Antibiotikaphrophylaxe höhere Dosierungen als für normalgewichtige Patienten?	17
<b>Trautmann, M.</b>	9631	Gibt es Optimierungsmöglichkeiten beim Hygienemanagement von MRSA-Patienten im OP-Alltag?	19
<b>Schwanz, T.</b>	9645	Sollen 3MRGN-besiedelte Patienten auf der Intensivstation isoliert werden?	21
<b>Schwegmann, K.</b>	9652	Bestehen hygienische Bedenken gegen Topfpflanzen im Patientenzimmer bei Patienten ohne besonderes Infektionsrisiko?	23
<b>Lübbert, C.</b>	9655	Wie ist die Anwendung von ungelöstem Vancomycin-Pulver im offenen Operationsgebiet zu bewerten?	24
<b>Geffers, C.</b>	9681	Wie sollte die Vorbereitung eines OP-Raumes gemäß KRINKO-Empfehlung aussehen?	26
<b>Bautsch, W.</b>	9687	Kann die Resistenz ausschließlich gegenüber Ertapenem innerhalb der Carbapeneme eine MRE-Meldepflicht auslösen?	28
		CME-Fragen	34