BIERMANN KOMPAKT

Anästhesiologie und Intensivmedizin

4/2019

Inhalt

| ➤ Schwerpunkt: Notfall- und Intensivmedizin |
|--|
| Zwerchfell- und Brustmuskulatur bei kritisch Kranken Atrophie beider steht nicht in BeziehungSeite 2 |
| Langfristige Lebensqualität kritisch kranker Patienten mit hohem Delir-Risiko Keine Beeinflussung durch prophylaktische Anwendung von HaloperidolSeite 2 |
| Ein-Jahres-Risiko für unerwünschte Ereignisse und Mortalität Ergebnisse unterstützen Influenza-Impfung für Intensivpatienten ab 65Seite 3 |
| Beatmete Erwachsene mit Schock Einfluss des Ernährungsweges auf die DarmschleimhautSeite 3 |
| |
| ➤ Perioperative Medizin |
| • |
| Durchblutung der Arteria carotis interna Verringerung unter Anästhesie und PneumoperitoneumSeite 3 |
| Vergleich von Mortalität und Komplikationen bei älteren Patienten mit Hüftfraktur |
| Bessere Ergebnisse bei der Regional- statt Allgemeinanästhesie |
| Frühere Gabe von Rocuronium vor Prüfung einer Maskenbeatmung Größeres Masken-VTe und frühere Intubation möglichSeite 4 |
| Neurologische Ergebnisse nach Herzoneration |
| Keine Verbesserung durch Lidocain |
| Nicht herzchirurgische Operationen unter Vollnarkose Ambulante Blutdruckmessung unersetzlich |
| Anästhesie bei primärer Hüft- und Knieendoprothetik |
| Primäre neuraxiale Anästhesie ist KonsensSeite 6 |
| Tubusbehandlung vor nasotrachealer Intubation Verringerung von Nasenbluten möglich |
| 30-Tage-Mortalitätsrisiko nach größerer Operation |
| Verbesserte präoperative BeurteilungSeite 8 |
| Sauerstoffversorgung während der Anästhesie Beeinträchtigung größer bei höherem Alter und BMISeite 9 |
| Operation mit mittlerem und hohem Risiko |
| CLV-Kontrolle minimiert perioperative HypotonieSeite 9 |
| |
| |
| ➤ Geburtshilfe |
| Depressionen bei Müttern 2 Jahre nach der Entbindung |
| Neuraxiale Wehenanalgesie ist besserSeite 6 |
| Tachypnoe bei Neugeborenen nach Kaiserschnitt Mit mütterlicher Hypotonie verbundenSeite 8 |
| Verbesserung der Geburt bei Erstgebärenden |
| Höherer Analgesie-Score mit PIEBSeite 8 |
| |
| ➤ Schmerzmedizin |
| |
| Präoperative Opioid- und Benzodiazepin-Verschreibungen Erhöhte Mortalität nach nicht herzchirurgischen OperationenSeite 4 |
| Einfluss von präoperativem Cannabinoidkonsum auf die perioperative Phase |
| Größere Schmerzen und schlechtere SchlafqualitätSeite 9 |
| Adduktorenkanalblockade bei der Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes |
| Proximale Injektionsstelle verringert OpioidverbrauchSeite 10 |
| |
| ➤ Forschung, Hochschule und VerbändeSeite 10 |
| ➤ IndustrieSeite 13 |
| - Manager - Mana |