


NEWS

- 2-6 Highlights vom ASCO-GI**
Klinische Fortschritte – bei allen Entitäten ■ Ösophaguskarzinom: Ösophagektomie vs. Radiochemotherapie in Stadium I ■ CRC-Prävention: Zahl der zirkulierenden Tumorzellen entscheidend ■ Magenkarzinom/AEG: Keine OS-Verlängerung durch Zugabe von Andecaliximab zu mFOLFOX6 in der Erstlinie ■ Magenkarzinom/AEG: Hyponatriämie als Risikofaktor für eine Frühprogression unter Nivolumab ■ Phase-II-Studie: Perioperative Immuntherapie mit Nivolumab +/- Ipilimumab beim resezierbaren HCC ist sicher ■ CI + SBRT bei fortgeschrittenem pankreatischen Adenokarzinom
- 7-8 ASH 2018 – Teil III**
Updates der Studien ELIANA und JULIET bestätigen tiefes und langanhaltendes Ansprechen auf Tisagenlecleucel ■ FL: Rituximab-Biosimilar CT-P10 auch im Langzeitverlauf vergleichbar wirksam und sicher
- 10-12 Fortgeschrittenes Leberzellkarzinom: Neue Therapieoption in der Erstlinientherapie**
A. Vogel, Hannover.
- 14-22**  **Indikationen zu Resektion und Transplantation beim HCC**
D. Seehofer, R. Sucher, T. Berg, Leipzig.
- 24-30 Aktuelle strahlentherapeutische Therapieoptionen in der Behandlung des Leberzellkarzinoms**
F. Walter, S. Gerum, S. Corradini, J. Ricke, C. Belka, München.
- 31-34 Therapiealgorithmen: Systemische medikamentöse Therapie bei NET**
- 35-41 NEN: Peptidrezeptor-Radionuklidtherapie (PRRT)**
C. Wetz, H. Jann und H. Arnthauer, Berlin.
- 42-50 Interventionell-radiologische Therapien in der Behandlung von neuroendokrinen Tumoren**
S. Viniol, A. König, J. Figiol, A. H. Mahnken, Marburg.

SERIE

- 51-53 Kombierter Ansatz von Mensch und Software: Die richtigen Entscheidungen in der Präzisionsonkologie treffen**
G. Bungartz, Köln, K. Bungartz, Riverton, WY, USA.

FORTBILDUNG

- 55-59 Onkologie-Summit 2018: NSCLC und Pankreaskarzinom**

BNGO

- 60-61 SABCS 2018: Erkenntnisse aus der SUCCESS-C-Studie zur Lebensstil-Intervention**
HER2-negatives frühes Mammakarzinom

d-u-o

- 62 Onkologie-Vereinbarung: Neue Ziffer für die orale zytostatische Tumorthherapie**
M. Johannsen, R. Eichenauer, R. Schönfelder, J. Klier, F. König, J. Schröder, E. Hempel, C. Doehn, Berlin.

PHARMAFORUM

- 63 Neue Therapieoption beim Hochrisiko-M0CRPC**
Apalutamid verlängerte MFS
- 64-65 Kolorektal- und Magenkarzinom**
Ramucirumab – ein Standard in der Zweitlinientherapie

STUDIEN

- 66-67 Erst- oder Folgelinientherapie beim metastasierten oder nicht-resektablen Urothelkarzinom**
H. Rexer, Schwarz, Prof. Dr. C.-H. Ohlmann, Berlin
Prof. Dr. A. Stenzl, Tübingen.
- 67 Studies of Special Interest**
Palliative Firstline-Therapie beim Hepatozellulären Karzinom ■ Phase-I-Studie für FGFR-positive Tumoren
- 68-69 BERGAMO-Studie: Bemcentinib soll das Wachstum von Leukämiezellen hemmen**
A. S. Kubasch, U. Platzbecker, Leipzig.

FÜR SIE VOR ORT

- 69-71 HCC: Cabozantinib verlängert Gesamtüberleben**
■ Chronische Leukämien: Moderne Tyrosinkinase-Inhibitoren bereichern die Therapielandschaft

AKTUELLES & ONLINE

- 54 Netzfunde**
- 71-73 Aktuelles & Online**