

► **Schwerpunkt: Schmerzmedizin und Geburtshilfe**

<i>Laparoskopische Cholezystektomie</i>	
Neue PROSPECT-Empfehlungen.....	Seite 4
<i>Atemwegsdepression nach Kaiserschnitt</i>	
Niedriges Risiko mit (Dia-)Morphin.....	Seite 4
<i>Ketamin-Infusion zur Behandlung neuropathischer Schmerzen</i>	
Prognostische Wirksamkeitsbestimmungen.....	Seite 5
<i>Neuraxiale Analgesie bei Erstgebärenden</i>	
Sofortiges und verzögertes Pressen bei spontanen vaginalen Geburten.....	Seite 5
<i>Balancierte Allgemeinanästhesie</i>	
Desfluran besser als Sevofluran für intraoperativen Remifantal-Bedarf.....	Seite 5
<i>Behandlung postspinaler Kopfschmerzen</i>	
Neostigmin + Atropin lindern Symptomatik.....	Seite 6
<i>Wundinfektionen nach Kaiserschnitt</i>	
Cefazolin prophylaktisch wirksam.....	Seite 8
<i>Abdomineller Tumorschmerz</i>	
RFA wirksamer als chemische Neurolyse.....	Seite 8
<i>Frakturrisiko bei älteren Patienten</i>	
Opioid-Einnahme ohne Einfluss.....	Seite 8

► **Intensivmedizin**

<i>Nierenersatztherapie bei Sepsis</i>	
Startzeitpunkt ohne Einfluss auf Mortalität.....	Seite 2
<i>Septischer Schock</i>	
Kein verbessertes Überleben durch Polymyxin-B-Hämoperfusion.....	Seite 6
<i>Entwöhnung von maschineller Beatmung</i>	
Nicht invasive Beatmung als Zwischenschritt ohne Vorteil.....	Seite 7

► **Postoperative Medizin**

<i>Agitation nach Allgemeinanästhesie</i>	
Verschiedene Faktoren erhöhen das Risiko.....	Seite 2
<i>Niedrigdosierte Sugammadex-Gabe</i>	
Hohes Alter – Hohes PORC-Risiko.....	Seite 6
<i>Postoperatives Delir bei geriatrischen Patienten</i>	
Sedierungstiefe hat kaum Einfluss.....	Seite 7

► **Lokal-/Regionalanästhesie**

<i>Ambulante Kniearthroskopie</i>	
Spinalanästhesie mit Chlorprocain vorteilhaft.....	Seite 4
<i>Pädiatrische Regionalanästhesie</i>	
Sicherheitsprofil vergleichbar mit Erwachsenen.....	Seite 6
<i>Neuraxiale Anästhesie bei Gelenkersatz</i>	
Spinalanästhesie mit günstigstem Ergebnisprofil.....	Seite 7

► **Sonstiges**

<i>Kinder mit oberen Atemwegsinfekten</i>	
Larynxmaske bietet keine Vorteile.....	Seite 2
<i>Magentleerungszeit bei Kindern</i>	
Vier Stunden Fasten ausreichend.....	Seite 4
<i>Infektionen nach Kolorektalchirurgie</i>	
Erhöhtes Risiko durch niedrigen Blutdruck.....	Seite 8

► **Forschung, Hochschule und Verbände.....**Seite 9

► **Industrie.....**Seite 10

► **Termine.....**Seite 11