

EASD

- 2 EASD-Kongress 2019 in Barcelona
Die Zeit ist reif für Veränderungen
- 6 GLP-1-Rezeptor-Agonisten im Vergleich
Welche klinisch relevanten Unterschiede es gibt
- 8 CAROLINA-Studie
DPP-4-Hemmer gleich sicher wie Sulfonylharnstoff
- 10 Multipotente SGLT2-Hemmer
Hoffnung für Typ-2-Diabetes-Patienten mit Nierenerkrankung
- 12 Neue Insulingeneration
Weniger Hypoglykämien mit lang wirksamem Insulin
- 14 VERIFY-Studie
Frühe DPP-4-Kombination bewirkt anhaltenden Effekt
- 16 DUAL-VIII-Studie
Kombination kontrolliert den Blutzucker länger
- 18 REWIND-Studie mit GLP-1-Rezeptor-Agonist
Herzschutz auch ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung

ESC

- 19 Jahreskongress der European Society of Cardiology (ESC) 2019
Der kardiologische Nabel der Welt war Paris
- 21 Neue ESC-Guideline
Stabile KHK heisst neu chronisches Koronarsyndrom
- 25 Neue Lipid-Guideline bei zu hohem Cholesterinwert
Die LDL-C-Zielwerte wurden reduziert
- 28 Interview mit Prof. Dr. med. Isabella Sudano, Universitätsspital Zürich
Bei der Behandlung der Lipide nicht zu viel Zeit verlieren
- 30 Antithrombotische Therapie bei stabiler KHK plus Vorhofflimmern
Monotherapie scheint sicherer als Kombination
- 31 ESC-Highlight-Studien
Wichtige Ergebnisse für die Herzinsuffizienztherapie