

Inhalt

► Schwerpunkt 1: Dialyse	Seite
<i>Dialysepatienten mit Typ-2-Diabetes</i>	
Liraglutid führt vermehrt zu Hypoglykämien.....	4
<i>Phosphatspiegel bei Patienten mit Erhaltungshämodialyse</i>	
Spezifische Ernährungstherapie reduziert das Serumphosphat	4
<i>Einleitung einer Schlafmitteltherapie bei Hämodialysepatienten</i>	
Zolpidem erhöht das Risiko einer sturzbedingten Fraktur mehr als Trazodon..	4
<i>Sekundärer Hyperparathyreoidismus</i>	
Parathormon beeinflusst das Outcome.....	8
► Schwerpunkt 2: Nierentransplantation	
<i>Zerebrale Anomalien bei Nierenerkrankung im Endstadium</i>	
Normalisierung nach Nierentransplantation	6
<i>Frakturen bei Nierentransplantat-Empfängern</i>	
Verstärktes Auftreten unter Protonenpumpen-Inhibitoren.....	6
<i>Nierentransplantierte mit direkter oraler Antikoagulanzenherapie</i>	
Wirksamkeit und Sicherheit ist gegeben	6
<i>Keratinozytenkarzinome bei Transplantatempfängern</i>	
Gefahr durch Hydrochlorothiazid.....	8
<i>COVID-19 und akute Niereninsuffizienz</i>	
Kein Unterschied zwischen Ethnien	8
<i>Akute Nierenschädigung nach herzchirurgischen Eingriffen</i>	
Erhöhtes Risiko bei Nierentransplantat-Empfängern.....	10
► Chronische Nierenerkrankung	
<i>Canagliflozin bei Typ-2-Diabetes</i>	
Nutzen steigt parallel zum Risiko	8
<i>Sitagliptin in höherer Dosierung</i>	
Herzinsuffizienzgefahr ist nicht erhöht	12
<i>Stark eingeschränkte Nierenfunktion</i>	
Canagliflozin zeigt positive Effekte.....	12
► Sonstiges	
<i>Hypertonic</i>	19
► Forschung, Hochschule, Verbände	13
► Industrie	14

Biermann Verlag
 64299 Pöfst.
 64299#650705
 Deutsche Z
 für Medizin
 Bestandsent
 Frau Pütz-
 Gleueler Str. 10
 50931 Köln

ZB MED
Zs.A 7081/X CC MED

2021, 2
Kompakt Nephrologie

Tacrolimus reduziert Rezidivrate