

## INHALTSVERZEICHNIS

Experte	Frage	Thema	Seite
Jäkel, C.	9630	Arzneimittelrechtliche Bewertung: Abweichung zwischen EUCAST-Empfehlungen und nationalen Fachinformationen zur zulässigen Tageshöchstdosis bei Antibiotika.	6
Glück, T.	9768	Postoperative/posthospitalisierte MRSA-Sanierung zur Reduktion postoperativer Wundinfektionen sinnvoll?	10
Geffers, C.	9776	Maßnahmen bei Hauswinkelspinnbefall im OP?	13
Lemmen, S.	9835	Notwendigkeit einer Dekolonisation eines PVL-MRSA positiven Säuglings?	15
Trautmann, M.	9852	MRSA-Eradikation: Sanierung von Neugeborenen oder Kindern im ambulanten Setting sinnvoll und erforderlich?	17
Geffers, C.	9912	Wechsel der OP-Kleidung nach Toilettengang erforderlich?	19
Glück, T.	9930	Therapiedauer bei bariatrischen Patienten mit Darm-Perforation prophylaktisch intraoperativ Pip/Taz + Fluconazol i.v.?	21
Witzke, O.	9934	Wie lange gilt ein Patient nach SARS-CoV2 Nachweis als infektiös?	24
Hagel, S.	9970	Was tun bei <i>S. aureus</i> -Bakteriämie mit Empfindlichkeit gegenüber Penicillin?	26
Dick, S.	9971	Allergische Reaktion auf Antibiotika in der Praxis.	28
Schwanz, T.	9973	Verhinderung der Kontamination des Kreisteil des Narkosegerätes durch Filter bei intraoperativer Narkosegasabsaugung von COVID-19-Patienten.	31
Ambrosch, A.	9990	Qualität und Quantität von Blutkulturdiagnostik.	33
Hagel, S.	10009	Perioperative Antibiotikaphylaxe bei Septorhinoplastik über 3-5 Tage sinnvoll?	36
Schulz-Stübner, S.	10025	Aufteilung von einer Ampulle Remifentanil auf zwei zubereitete Spritzen aus hygienischer Sicht in Ordnung?	38
Schulz-Stübner, S.	10089	Akkumulation virushaltiger Aerosole an innenliegenden Computerkomponenten und das resultierende Infektionsrisiko.	40