



ELCC 2021 Virtual

CME-Fortbildung NSCLC

CME-Fortbildung Prostatakarzinom

▶ S. 2-3

▶ S. 4-15

▶ S. 44-49

NEWS

- 2-3 **ELCC 2021 Virtual**
Tepotinib führt bei NSCLC mit METex14-Skipping-Mutation zu dauerhaftem Ansprechen ■ Durvalumab beim NSCLC zur Konsolidierung und beim SCLC als Chemoimmuntherapie zugelassen

NSCLC

- 4-11 **Update: Checkpoint-Inhibitoren in der Therapie des fortgeschrittenen NSCLC**
I. Watermann, M. Reck, Großhansdorf.
- 12-15 **Therapie von Pancoast-Tumoren**
R. Serve, S. Sponholz, S. Trainer, Frankfurt.
- 16-21 **Personalisierte Erstlinientherapie des fortgeschrittenen NSCLC**
S. Gütz, Leipzig.

MAMMAKARZINOM

- 22-30 **Endokrin-basierte Kombinationstherapien beim metastasierten HR+/HER2-negativen Mammakarzinom**
H.-C. Kolberg, Bottrop und Wiesbaden, C. Kolberg-Liedtke, Wiesbaden und Essen.
- 32-36 **HER2-mutiertes metastasiertes Mammakarzinom**
K. Berner, J. Waldschmidt, I. Juhasz-Böss, T. Erbes, Freiburg.

FORTBILDUNG

- 37 **Chemotherapie-Dosis bei Adipositas – mehr Toxizität oder geringere Wirksamkeit?**
Statement von M. Kowefateia, Wernigerode.
- 38-42 **Mantelzell-Lymphom: Unterschiedliche morphologische und molekulare Varianten mit Bedeutung für die Klinik**
K. S. Kurz, G. Ott, Stuttgart.
- 44-45 **CRPC mit Mikrometastasen: Definition des M0CRPC muss neu überdacht werden**
D. Pfister, Köln.
- 46-49 **Fokale Therapie des lokal begrenzten Prostatakarzinoms**
P. Faraj Tabrizi, I. Peters, Hannover.

FORTBILDUNG

- 51-54 **HCC: Neue Therapieoption in der Erstlinie**
J. Marquardt, Lübeck.
- 55-56 **COVID-19 und Krebs: Impfungen bei Patienten mit Multiplem Myelom einschließlich COVID-19-Impfempfehlung**
A. Heinl, Regensburg.

STUDIEN

- 59-61 **AUO: PREPARE (AN 49/18)**
- 61 **IKF: COSTAR Lung ■ PREVENT**
- 62 **TRANSFORM-1: Primäre und sekundäre Myelofibrose ■ TRANSFORM-2: Vorbehandelte primäre und sekundäre Myelofibrose**

FÜR SIE VIRTUELL

- 64-72 **Selpercatinib bei RET-fusionspositivem und RET-mutiertem medullärem Schilddrüsenkarzinom wirksam und gut verträglich ■ Anhaltender Benefit durch Brentuximab Vedotin beim HL über alle Therapielinien ■ Bayer: Die Möglichkeiten der Präzisionsonkologie ■ Aktualisierungen in den AGO-Empfehlungen für die Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms ■ Fortgeschrittenes Cholangiokarzinom mit FGFR2-Fusion oder -Rearrangement: Hohe Gesamtansprechrate unter Pemigatinib ■ Fortgeschrittener Brustkrebs: Lebensqualität unter Therapie im Fokus**

PHARMAFORUM

- 74-75 **Atezolizumab als First-Line-Monotherapie beim NSCLC: Höhere Überlebensrate, bessere Verträglichkeit, unabhängig von der Tumorphistologie**
- 76-77 **R/R MCL: Hohe Ansprechraten auf CAR-T-Zelltherapie**
- 78-79 **Mammakarzinom: Extendierte adjuvante Therapie mit Neratinib kann Rezidivrisiko senken**

AKTUELLES & ONLINE

- 50 **Netzfunde**
- 80 **Veranstaltungshinweise**
- 81-85 **Online-Nachrichten**