

#### 134 SPHINGOSIN-1-PHOSPHAT-REZEPTOR-MODULATOR

## Ponesimod

Der Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulator Ponesimod (Ponvory®) ist zur Therapie von erwachsenen Patienten mit schubförmig remittierender multipler Sklerose indiziert. Bei den Betroffenen kann eine signifikante Verringerung der Schubrate erreicht werden.

#### 139 GEGEN CD123 GERICHTETES ZYTOTOXIN

## Tagraxofusp

Zur Behandlung von blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasien kann ab sofort Tagraxofusp (Elzonris®) eingesetzt werden. Das Fusionsprotein aus Interleukin 3 und einem Diphtherie-Toxin ist als Erstlinien-Therapeutikum für erwachsene Patienten indiziert.

#### 142 INHIBITOR VON $\beta$ -LACTAMASEN

## Relebactam

Für im Krankenhaus erworbene Pneumonien und schwer zu behandelnde Infektionen mit aeroben gramnegativen Erregern steht nun ein antibiotisches Kombinationspräparat mit dem neuen  $\beta$ -Lactamase-Hemmer Relebactam (Recarbrio®) zur Verfügung.

#### 145 ANTIKÖRPER GEGEN DEN CHECKPOINT-REZEPTOR PROGRAMMED-DEATH-1

## Dostarlimab

Patientinnen mit rezidivierendem oder fortgeschrittenem Endometriumkarzinom können nun mit dem Wirkstoff Dostarlimab (Jemperli®) behandelt werden. Der monoklonale IgG4-Antikörper ist gegen den Checkpoint-Rezeptor Programmed-Death-1 (PD-1) gerichtet.

#### 148 PLASMA-KALLIKREIN-INHIBITOR

## Berotalstat

Der Plasma-Kallikrein-Inhibitor Berotalstat (Orladeyo®) wird bei Patienten mit hereditärem Angioödem eingesetzt. Der Wirkstoff dient zur routinemäßigen Prävention wiederkehrender Erkrankungsattacken, die durch lebensbedrohliche Schwellungen und starke gastrointestinale Beschwerden gekennzeichnet sind.