

Inhalt

► Schwerpunkt: Mammakarzinom

<i>Fortgeschrittener Brustkrebs</i>	
Gesamtüberleben mit Ribociclib plus Letrozol besser als mit alleinigem Letrozol.....	3
<i>Pathogene Keimbahnvarianten in neun Brustkrebs-Suszeptibilitätsgenen</i>	
Assoziation mit triple-negativer und/oder hochgradiger Erkrankung gefunden	4
<i>Adjuvantes Pertuzumab zu Trastuzumab und Chemotherapie bei frühem HER2⁺ Brustkrebs</i>	
Sechsjähriger absoluter invasiver krankheitsfreier Überlebensvorteil	4
<i>Neue Ergebnisse der KEYNOTE-522-Studie zum frühen triple-negativen Brustkrebs</i>	
Pembrolizumab verlängert das ereignisfreie Überleben	4
<i>Capecitabin als Teil einer neo-/adjuvanten Chemotherapie bei Brustkrebs</i>	
Verbesserung von krankheitsfreiem und Gesamtüberleben	6
<i>Adjuvante Bisphosphonate und andere knochenmodifizierende Wirkstoffe bei Brustkrebs</i>	
Leitlinie wurde aktualisiert	6
<i>Lokale Behandlung der primären Lokalisation von Brustkrebs im De-novo-Stadium IV</i>	
Weniger lokoregionäre Progression – Überleben und Lebensqualität vergleichbar	6
<i>Nutzen einer adjuvanten Chemotherapie bei Patientinnen mit N⁺ Brustkrebs</i>	
Verlängerung des Überlebens in der Prä-, aber nicht Postmenopause	7
<i>Bestimmung eines ultraniedrigen Risikos per 70-Gen-Signatur</i>	
Übertherapie bei frühem Brustkrebs wahrscheinlich vermeidbar	7
<i>HER2⁺ metastasierender Brustkrebs mit und ohne Hirnmetastasen</i>	
Kombination mit Tucatinib bietet klinisch bedeutsamen Überlebensvorteil	7
<i>Endokrine Therapie bei ER⁺, HER2⁻ Brustkrebs im Stadium I</i>	
Signifikant weniger Brustkrebsereignisse beobachtet	8
<i>Neoadjuvante Chemotherapie mit oder ohne Carboplatin und Bevacizumab beim TNBC</i>	
Immunaktivierungsmarker in Biopsien mit Ansprechen und Überleben assoziiert	8
<i>Prämenopausale Frauen mit ER⁺ Brustkrebs im Frühstadium und Ovarialsuppression</i>	
Aromatasehemmer verringern das Risiko eines erneuten Auftretens	11

► Endometriose

<i>Einfluss der Endometriose auf die sexuelle Funktion</i>	
Weibliche Sexualfunktion verringert und Schmerzintensität erhöht	8
<i>Peri- und postoperative Ergebnisse einer Hysterektomie</i>	
Patientinnen mit Endometriose haben höheres Risiko für mehr Blutverlust	10
<i>Unfruchtbare Frauen mit tief infiltrierender Endometriose</i>	
Gute postoperative und reproduktive Ergebnisse beobachtet	12
<i>Eierstockreserve bei Patientinnen mit Eierstock-Endometriom</i>	
Ovarielle Reserve nimmt trotz Vasopressin-Gabe ab	12

► Schwangerschaft und Geburt

<i>Plazenta-accreta-Spektrum-Störungen</i>	
Diagnose per Ultraschall genauso gut möglich	10
<i>Auswirkungen eines sekundären Kaiserschnitts</i>	
Risiko einer Frühgeburt in nachfolgender Schwangerschaft erhöht	10
<i>Niedrigrisikoschwangerschaften mit reduzierten Kindsbewegungen</i>	
Zerebroplazentares Verhältnis ist für das neonatale Ergebnis nicht prädiktiv	12

► Forschung, Hochschule & Verbände..... 14