



---

**Originalarbeit**

- Freies Vitamin D ist bei Diabetikern mit eingeschränkter Nierenfunktion unabhängig assoziiert mit dem systolischen Blutdruck 293  
*S. Zeng, D. Bachert, M. Pavkovic, P. Sandner, C.-F. Hoher, O. Tsuprykov, S. Morgera, B.K. Krämer, B. Hoher und S. Elitok*
- 

**Übersichten**

- Behandlungswege einer terminalen Niereninsuffizienz: Neue Möglichkeiten für Ältere mit hoher Krankheitslast 301  
*P.M. Rob*
- Neue ESC-Leitlinien Herzinsuffizienz – Das Wichtigste zur Diagnose und Therapie an der Schnittstelle Kardiologie und Nephrologie 306  
*V. Brandenburg, J. Bauersachs, M. Böhm, D. Fliser, S. Frantz, N. Frey, G. Hasenfuß und J.T. Kielstein*
- 

**Fallberichte**

- Die „neue normale“ osmotische Schwelle: Reset des Osmostats 315  
*L.G. Rigueto, H.M. Santiago, D.J. Hadad, A. Carlos Seguro, A.C.C. Girardi und W.M. Luchi*
- Minimal-Change-Glomerulonephritis nach mehreren Wespenstichen 321  
*Y.S. Humeda, W.L. Clapp und H. Humeda*
- 

- Industrienachricht 326
-