

URO-ONKOLOGIE

112-132

Prostatakarzinom

Überleben nach radikaler Prostatektomie vs. Strahlentherapie

Mikrobiome von Urin und Prostata – direkter Zusammenhang mit den PCa-Risikogruppen

mCRPC: Abirateron plus Olaparib vs. Abirateron und Placebo

mCRPC: Exploration der PROfound-Studie

Risikofaktoren für Knochenmetastasen bei Patienten mit neu diagnostiziertem PCa

Darolutamid: Überleben mit metastasiertem, hormonsensitivem Prostatakrebs

Ein oraler RSK-Inhibitor supprimiert AR-Varianten und Tumorwachstum

Sphingosinkinase 1: Neuer Ansatz für eine zielgerichtete Therapie des neuroendokrinen PCa?

Gereifte Daten von ARCHES: Verlängertes Überleben mit Enzalutamid über Subgruppen hinweg

Sind Zellen des mCRPC in hormonnaivem Prostatakrebs bereits vorhanden?

Von Patienten bewertet: Einfluss von Enzalutamid auf die Lebensqualität in Subgruppen

Urothelkarzinom

Unterschiedliches Ansprechen auf eine neoadjuvante Chemotherapie

Genomische Merkmale eines MIBC, das nach Bestrahlung der Prostata entstanden ist

Von Patienten beurteilter Therapieerfolg: Avelumab als Erstlinien-Erhaltungstherapie

Pembrolizumab als Erstlinientherapie mit / ohne Lenvatinib

Nierenzellkarzinom

Wie beurteilen Patienten die Behandlung in der Erstlinie mit Nivo plus Cabo vs. Sunitinib?

Pembrolizumab plus Axitinib vs. Sunitinib als Erstlinientherapie: Zeit bis zum Progress bei erster Folgetherapie

Überleben und langfristige Effektivität mit Nivo plus Ipilimumab vs. Sunitinib

MEDIZINRECHT

134-135

Kostenlast beim Akteneinsichtsrecht des Patienten

ANDROLOGIE

136-138

Bericht vom Symposium Reprofacts: Neues aus der Andrologie

Die Wiederherstellung des Serum-Testosteronspiegels als Überlebensprädiktor bei COVID-19-Patienten

Kardiovaskuläre Ereignisse bei der Testosteronbehandlung: Metaanalyse

HEAT-Studie: Hämatokritanstieg mit lang wirksamem T-Undecanoat vs. Testosteron-Gel

UROLOGIE

139-140

Ernährungsbezogenes Sammeln des Urins und die Kategorisierung von Hyperoxalurie

Nierensteinen und primärer Aldosteronismus

Stressinkontinenz bei älteren Männern: Prädiktoren für das Bereuen der Therapieentscheidung

ADT und die klinischen Ergebnisse von hospitalisierten Männern mit COVID-19

PHARMAFORUM / Meldungen

142-143

Ultraschall in der Urologie: Künstliche Intelligenz verbessert die Früherkennung von Prostatakrebs

Neu seit 1. Juli 2022: Testosterontherapie mit transdermalem Gel im praktischen 40,5 mg Beutel

Neue Zulassung für Dysport® im Bereich Urologie

Impressum