

Perspektiven

Geldmangel rettete Kollegen das Leben

Aber sein Bruder erlag der seltenen Erbkrankheit. 19

Was zahlt die Kasse eigentlich?

KV will Kollegen die Höhe der BKK-Kopfpauschalen nicht verraten. 21

Praxisführung und Geld

Chronischer Zeitdruck?


Selbsttest entlarvt Effizienz-Killer. 37

Fehlende Arme und Beine übersehen

Jetzt zahlt die Frauenärztin lebenslang Unterhalt. 39

Impressum 39

Mit dem Passwort doc finden Sie in www.medical-tribune.de spezielle Informationen für Ärzte.




Osteoplus®
Wirkstoff: Calciumcarbonat, Colecalciferol. **Zusammensetzung:** 1 Brausetabl. enthält 2.500 mg Calciumcarbonat, entspr. 1.000 mg Calcium und 0,025 mg Colecalciferol, entspr. 1.000 IE Vit. D₃. **Sonst. Bestandteile:** All-rac-alpha-Tocopherol, Aromastoffe, Citronensäure, Gelatine, Lactose-Monohydrat, Macrogol, Maisstärke, Methylcellulose, Natriumcyclamat, Natriumhydrogencarbonat, Povidon, Saccharin-Natrium, Saccharose, Simeticon, Sojabohnenöl.
Anwendungsgebiete: Unterstützende Beh. v. Osteoporose, nachgewiesener Calcium- u. Vit. D₃-Mangel. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Schwangersch., Stillzeit, Kdr. bek. Überempf. gegen einen d. Bestandteile, Niereninsuff., Hypercalcämie, Hypercalcurie, prim. Hyperparathyreoidismus, Nierensteinen, langzeitiger Immobilisierung mit gleichz. erhöhten Blut o. Harncalciumwerten. **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:** Bei Langzeitbeh.: Nierenfunktion, Calcium-Serum- u. -Harnwerte regelmäßig prüfen; wenn Harncalciumkonzentr. über 7,5 mmol/24h, Dosis reduzieren oder absetzen. Vit. D-Gehalt von Osteoplus® bei Verabreich. anderer Vit. D- oder Vit. D-Derivat-haltigen Arzneimittel beachten. **Zusätzl. Gabe solcher Präparate nur unter ärztl. Überw. mit wöchentl. Kontrolle d. Serum- u. Urincalciumspiegels. Wg. des erhöhten Metabolismus von Vit. D zu seiner wirksamen Form bes. Vorsicht bei Pat. mit Sarkoidose. Bei solchen Pat. sollten die Serum- und Urincalciumspiegel sorgfältig und regelm. geprüft werden. Vors. bei Pat. mit Knochenmetastasen wg. des Risikos einer Hypercalcämie. **Nebenwirkungen:** Selten: Gastroint. Beschw., Sehr selten: Bei längerer Einnahme von Osteoplus® Hypercalcurie möglich. **Versinzelt:** Bei Dauerbeh. mit hohen Dosen Hypercalcämie möglich. **Apothekenpflichtig**
Stand: Dezember 2001
Merckle GmbH 89143 Blaubeuren.**



Hier ist Platz für Ihre Meinung ...

Redaktion Medical Tribune
Postfach 42 40
65032 Wiesbaden
Fax (06 11) 97 46-304
@ E-Mail: kontakt@
medical-tribune.de



bei antit
haltende
nicht-an
3. Die
sorgeun
befriedig
1000 Eur
chungen
sparen. I
Krebsvor
Aussicht
4. Ma
Spontan
5. Spo
bei an

Leitl
Ko
nic

Zu Dr. Dr
mehr für
bildung
MT 21/0

An M
Herrn
tigt, was
der Logik
Das ein
leitlinien
Gutachte
sich um
Empfleh